



日本薬局方

アンモニア水

販売名：アンモニア水「昭和」P

第3類医薬品

⚠ 使用上の注意

☒ してはいけないこと [守らないと現在の症状が悪化したり副作用が起こりやすくなる]

次の部位には使用しないこと。

- (1) 口唇等粘膜の部分や目のまわり。
- (2) 傷のある所、ただれたり、かぶれています。



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

(1) 医師の治療を受けている人。

(2) 本人又は家族がアレルギー体質の人。

(3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

(4) 濡潤やただれのひどい人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

関係部位	症 状
皮 ふ	発疹、はれ、灼熱感

3. 5~6日間使用しても症状の改善がみられない場合は使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

効能・効果

虫さされ、虫さされによるかゆみ、気付け

用法・用量

5~10倍に希釈して患部に軽く塗る。

気付けにはかるく臭いをかがせる。

〈用法・用量に関連する注意〉

1. 定められた用法・用量を厳守すること。
2. 外用にのみ使用し、内服しないこと。
3. 目に入らないよう注意すること。万一目にに入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い流し、直ちに眼科医の診療を受けること。
4. 小児に使用する場合には、保護者の指導監督のもとに使用すること。
5. 局所刺激作用があるので患部にうすく塗るだけにとどめ、ガーゼ、脱脂綿等に浸して患部に貼付しないこと。

第3類医薬品

60mL

日本薬局方

アンモニア水

販売名：アンモニア水「昭和」P

虫さされに



昭和製薬株式会社

大阪府守口市南寺方東通1-4-12

お問い合わせ 06-6996-5111

成分・分量

アンモニア9.5～10.5w/v%を含有する。

保管及び取扱い上の注意

1. 小児の手の届かないところに保管すること。
2. 直射日光を避け、なるべく涼しい所に密栓して保管すること。
3. 振発性があるので、使用後は密栓すること。
4. 誤用を避け、品質を保持するために、他の容器に入れかえないこと。
5. 使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。

副作用救済制度 ☎ 0120-149-931



紙
箱



ボトル
キャップ
フィルム

製造
番号

使用
期限



4 950498 170135

第3類医薬品


60mL

日本薬局方

アノモニア水

販売名：アンモニア水「昭和」P

虫さされに



昭和製薬株式会社
大阪府守口市南寺方東通1-4-12
お問い合わせ 06-6996-5111