

ここから
開けてください

第2類医薬品

販売名 インテクリーム1%

この説明文書は、ご使用前に必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう保管してください。

【使用上の注意】

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は使用しないでください

- (1) 本剤または本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (2) ぜんそくを起こしたことがある人。

2. 次の部位には使用しないでください

- (1) 目の周囲、粘膜等。
- (2) 湿疹、かぶれ、傷口。
- (3) みずむし・たむし等または化膿している患部。

3. 長期連用しないでください

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦または妊娠していると思われる人。
- (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

発疹・発赤、かゆみ、はれ、ヒリヒリ感、熱感、乾燥感

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

発疹・発赤、かゆみ、はれ、ヒリヒリ感、熱感、乾燥感

【効能・効果】

筋肉痛、肩こりに伴う肩の痛み、腰痛、関節痛、腱鞘炎(手・手首の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、捻挫

【用法・用量】

1日4回を限度として適量を患部に塗擦してください。

〔用法・用量に関連する注意〕

- (1) 11歳以上の小児に使用させる場合には保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) 11歳未満の小児には使用させないでください。
- (3) 目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (4) 外用にのみ使用してください。
- (5) 1週間当たり50gを超えて使用しないでください。
- (6) 薬剤塗擦後の患部をラップフィルムなどの通気性の悪いもので覆わないでください。
- (7) 定められた用法・用量をお守りください。



発売元
東光クリエート株式会社
東京都足立区鹿浜1丁目9番14号
製造販売元
東光薬品工業株式会社
東京都足立区新田2丁目16番23号

◆お問い合わせ先◆
お客様相談窓口 03-3855-0101

副作用被害救済制度
電話 0120-149-931

インドメタシン局所吸収薬

インテクリーム

1%

滑らかで
刺激の少ない

クリーム 50g

肩こりの
痛み

関節痛

腰痛

筋肉痛
腱鞘炎
肘の痛み
打撲
捻挫

【成分・分量】100g中
インドメタシン…1,000mg
L-メントール…3,000mg
添加物:ミリスチン酸イソプロピル、エタノール、ジソプロパノールアミン、エデト酸Na水和物、オキシベンゾン、パラベン、カルボキシビニルポリマー、スクワラン、アジピン酸ジイソプロピル、ハアセチルしよ糖、ポリオキシエチレンセチルエーテル

- 【保管及び取扱い上の注意】
- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
 - (2) 小児の手のとどかない所に保管してください。
 - (3) 他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる)
 - (4) 本剤のついた手で、目などの粘膜にふれないでください。
 - (5) 使用期限(外箱及びチューブに記載)を過ぎた製品は使用しないでください。

瀬谷 昭雄
堀田 道雄



第2類医薬品