

第3類医薬品

ウチダの和漢生薬 ウチダの 山梔子末

日本薬局方 サンシシ末



使用上の注意



相談すること

- 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談すること
 - 医師の治療を受けている人。
 - 今までに薬や化粧品等によるアレルギー症状（例えば発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等）を起こしたことがある人。
 - 切傷等の外傷のある人。
- 次の場合は、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師又は薬剤師に相談すること
 - 発疹・発赤、かゆみ等の症状があらわれた場合
 - 5～6日間使用しても症状がよくなる場合

●お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店または下記にお願い申し上げます。

株式会社 ウチダ和漢薬 03-3806-4141

受付時間 9:00～17:30（土、日、祝日を除く）

副作用被害救済制度の問合せ先

（独）医薬品医療機器総合機構

<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>

電話 0120-149-931（フリーダイヤル）

効能・効果

うちみ、ねんざ

用法・用量

若干のコムギ粉と混ぜ、水で練って外用する。

用法・用量に関連する注意

- 定められた用法・用量を厳守すること。
- 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐ水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。
- 本剤は外用にのみ使用し、内服しないこと。

成分・分量

本品 1 g 中

日本薬局方サンシシ末 1 g

保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- 小児の手の届かない所に保管すること。
- 他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。）

V T G



株式会社 ウチダ和漢薬
東京都中央区日本橋本町 4-2-8