

# ウチダの山梔子末 70g



MTB

**第3類医薬品** **ウチダの山梔子末 70g**  
日本薬局方サンシシ末

**用法・用量**  
若干のコムギ粉と混ぜ、水で練って外用する。

**用法・用量に関連する注意**

- (1) 定められた用法・用量を厳守すること。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- (3) 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐ水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。
- (4) 本剤は外用にのみ使用し、内服しないこと。

**効能・効果**  
うちみ、ねんざ

**⚠ 使用上の注意**

**■ 相談すること**

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
  - (1) 医師の治療を受けている人。
  - (2) 今までに薬や化粧品等によるアレルギー症状（例えば発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等）を起こしたことがある人。
  - (3) 切傷等の外傷のある人。
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

**保管及び取扱い上の注意**

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。  
(誤用の原因になったり品質が変わる。)

<お問合せ先> お客様相談センター  
 株式会社ウチダ和漢薬 電話 03-3806-4141  
 受付時間 9:00～17:30（土、日、祝日を除く）

副作用被害救済制度 電話 0120-149-931



**第3類医薬品** ウチダの山梔子末

MMK

用法・用量 日本薬局方サンシシ末

若干のコムギ粉と混ぜ、水で練って外用する。

**用法・用量に関連する注意**

- (1) 定められた用法・用量を厳守すること。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- (3) 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐ水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診察を受けること。
- (4) 本剤は外用にのみ使用し、内服しないこと。

効能・効果 うちみ、ねんざ

**⚠ 使用上の注意**

**👨‍⚕️ 相談すること**

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
  - (1) 医師の治療を受けている人。
  - (2) 今までに薬や化粧品等によるアレルギー症状（例えば発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等）を起こしたことがある人。
  - (3) 切傷等の外傷のある人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

**保管及び取扱い上の注意**

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。  
(誤用の原因になったり品質が変わる。)

●お問合せ先 株式会社ウチダ和漢薬  
電話 03-3806-4141 受付時間 9:00～17:30 (土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度  
電話 0120-149-931