

しっしん・かぶれ・皮ふ炎に

エマゼン軟膏

〈外用薬〉

◆エマゼン軟膏は、しっしん、かぶれ、皮ふ炎、かゆみなどの炎症症状にすぐれた効果をあらわします。のびがよい軟膏タイプです。



使用上の注意



❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

- ① 次の部位には使用しないでください
水痘(水ぼうそう)、みずむし・たむし等又は化膿している患部。
- ② 長期連用しないでください



相談すること



- ① 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
(3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(4) 患部が広範囲の人。
(5) 湿潤やただれのひどい人。
(6) 深い傷やひどいやけどの人。
- ② 次の場合は、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師に相談してください
(1) 使用后、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症 状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ
皮ふ (患部)	みずむし・たむし等の白癬症、にきび、 化膿症状、持続的な刺激感

- (2) 5～6日間使用しても症状がよくなる場合。

効 能

湿疹、皮ふ炎、ただれ、あせも、かぶれ、かゆみ、しもやけ、虫さされ、じんましん


用法・用量

1日数回、適量を患部に塗布してください。

【注意】

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (4) 外用にのみ使用してください。

- ※患部をきれいにしてからお薬を塗ってください。
- ※指先で強くこすらないように薄く塗布します。
- ※治りかけたら、回数を減らしてください。
- ※使用后、手についたお薬はふき取ってください。



〈チューブの穴の開け方〉

キャップを逆さにして、突起部をチューブの先に強く押し当ててください。

成分

100g中

成分	分量	はたらき
酢酸デキサメタゾン	0.025g	しっしん・かぶれなどの炎症をおさえ、発赤・はれをしずめます。
イソプロピルメチルフェノール	0.1g	殺菌作用があります。
酢酸トコフェロール	2.0g	血行を良くして、患部の治りをはやめます。
パルミチン酸レチノール	200000 I.U.	皮ふに栄養を与え、患部の治りを助けます。
dl-メントール	0.5g	患部に清涼感を与え、かゆみをやわらげます。

添加物：ミリスチン酸オクチルドデシル、セレシン、パラフィン、乳酸セチル、ゲル化炭化水素、プロピレングリコール、ポリソルベート60、ワセリン

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。
なお、使用期限内であっても、開封後はなるべく早く使用してください。(品質保持のため)



本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、又は下記にお問い合わせいたします。

連絡先 大正製薬株式会社 お客様119番室

電話 03-3985-1800

受付時間 8:30~21:00(土、日、祝日を除く)



大正製薬株式会社

東京都豊島区高田3丁目24番1号

<http://www.taisho.co.jp>