

鎮痒消炎薬

オイチミン®

しっしん・皮ふ炎に

オイチミンは…

- 日常よくみられるしっしん、皮ふ炎、かぶれによる炎症やかゆみに効果をあらわします。
- 殺菌剤を配合していますので、細菌の感染による症状の悪化を防ぎます。
- のびのよい油脂性の軟膏です。患部がカサカサしている時、ジुकジुकしている時のどちらでも使用できます。

使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の部位には使用しないでください
水痘(水ぼうそう)、みずむし・たむし等又は化膿している患部。
2. 長期連用しないでください

🗨️ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師にご相談ください
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
(3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(4) 患部が広範囲の人。
(5) 湿潤やただれのひどい人。
2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師にご相談ください
(1) 使用後、次の症状があらわれた場合



関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
皮ふ(患部)	みずむし・たむし等の白癬症、にきび、化膿症状、持続的な刺激感

- (2) 5～6日間使用しても症状がよくなる場合

〔効 能〕 しっしん、皮ふ炎、かぶれ、かゆみ、虫さされ、あせも、ただれ、じんましん、しもやけ

〔用法・用量〕 1日数回、患部に適量を塗布します。

〔用法・用量に関連する注意〕

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。
なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (4) 外用にのみ使用してください。

〔成分・分量と働き〕

成 分	分 量	働 き
酢酸デキサメタゾン	0.025%	しっしん、皮ふ炎、かぶれによる炎症を抑えます。
グリチルレチン酸	0.3%	
クロタミトン	5%	かゆみを抑えます。
イソプロピル メチルフェノール	0.1%	細菌による二次感染を防ぎ、しっしんやかぶれなどの悪化を防ぐ殺菌剤です。

油脂性基剤

添加物として、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、ゲル化炭化水素、香料、安息香酸、フェニルエチルアルコール、ベンジルアルコールを含有します。

🔒 ●保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。)
- (4) 使用期限をすぎた製品は、使用しないでください。



👏 ●お手当のアドバイス

1. 患部を清潔にしてからオイチミンを塗布してください。
2. 通常の場合……
指先で強くこすらないようにうすく塗布します。治りかけてきたら回数をへらしてください。
3. 患部がジुकジुकしていたり、かさぶたがある場合……
厚めに塗布します。かさぶたは無理にはがさないようにしてください。

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願ひ申し上げます。
佐藤製薬株式会社 医薬情報部「お客様相談室」
電話 03(5412)7393
受付時間 9:00～18:00 (土、日、祝日を除く)

佐藤製薬株式会社
東京都港区元赤坂1丁目5番27号
MANUFACTURED BY
SATO PHARMACEUTICAL CO., LTD. JAPAN
IMPORTED & DISTRIBUTED BY
SATO PHARMACEUTICAL CO., LTD. JAPAN
MADE IN JAPAN