



2013年3月 記載要領変更に伴う改訂

第2類  
医薬品ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。  
また、必要な時読めるよう大切に保管してください。

## 殺菌消毒薬

キップパイロール-Hiは…

キップ  
パイロール-Hi®軽度のやけど、日やけ、  
切傷、ひび、あかぎれに

- 殺菌剤イソプロピルメチルフェノールを配合して、殺菌力を高めた製品です。
- ジクジクしている患部にも、カサカサしている患部にも使えますのでご家庭の常備薬として重宝です。
- 酸化亜鉛を微粉化し、分散しやすくしていますので、塗った時、白く目立ちません。



## 使用上の注意



## 相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください
  - (1) 医師の治療を受けている人。
  - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
  - (3) 患部が広範囲の人。
  - (4) 湿潤やただれのひどい人。
  - (5) 深い傷やひどいやけどの人。
- 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください



| 関係部位 | 症 状       |
|------|-----------|
| 皮 膚  | 発疹・発赤、かゆみ |

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください

## 〔効 能〕

軽度のやけど、切傷、すり傷、ひび、あかぎれ、かみそりまけ、日やけ、雪やけによる炎症

## 〔用法・用量〕

疾患の程度により、適量を患部に塗布するか、又はガーゼ等のにぼして貼付します。

## 〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (4) 外用にのみ使用してください。

[成分・分量と働き] 100g中

| 成分                 | 分量     | 働き                              |
|--------------------|--------|---------------------------------|
| イソプロピル<br>メチルフェノール | 0.1g   | 殺菌作用により、細菌による二次感染を防ぎ、治りを早めます。   |
| 酸化亜鉛               | 6.018g | 患部の治りを早めます。                     |
| フェノール              | 0.444g | 患部を殺菌し、軽度のやけどや切傷、すり傷による炎症を抑えます。 |
| サリチル酸              | 0.056g |                                 |

添加物として、パラフィン、サラシミツロウ、ラノリン、サリチル酸メチル、ワセリン、香料を含有します。

◎保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。  
(誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。)
- (4) 使用期限をすぎた製品は、使用しないでください。
- (5) チューブに穴を開ける際には、キャップの頭部にある凸部をチューブ出口に深く押し込んで、大きな穴を開けてください。



◎このような時、お使いください

★軽度のやけどに

まず冷やします。そのあと塗ってください。皮がむけたり、痛みがある時は、ガーゼ等のにばして患部に貼り、ホウタイをします。

★切傷、すり傷に

傷口をきれいにし、そのあと塗ってください。ガーゼ等のにばして、患部に貼り、ホウタイをするのもよいでしょう。

★ひび、あかぎれに

患部をお湯できれいにします。そのあとマッサージをするようによくすりこんでください。さらに手袋やソックスで保護するとよいでしょう。

★かみそりまけに

ヒゲそり後によくすりこんでください。かみそりまけで痛みのある場合には、うすく、そっと塗ります。

★日やけ、雪やけによる炎症に

強い日光に長時間さらすと皮膚は水分を失い、炎症を起こしてヒリヒリ痛んだり、水疱ができます。このような日光による炎症には患部をよく冷やし、そのあとうすく塗ってください。軽度のやけどと同じように、ガーゼ等のにばして患部に貼るのもよいでしょう。

副作用検査救済制度のお問い合わせ先  
(独)医薬品医療機器総合機構  
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>  
電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。  
佐藤製薬株式会社 お客様相談窓口  
電話 03 (5412) 7393  
受付時間：9:00～17:00 (土、日、祝日を除く)

発売元  
**佐藤製薬株式会社**  
東京都港区元赤坂1丁目5番27号  
製造販売元  
**キップ薬品株式会社**  
東京都目黒区大岡山1丁目34番14号