

この説明文書は、お薬とともに保管し、
ご使用の際には、必ずお読み下さい。

鎮痒・消炎薬

アルファ
サーチα

第②類医薬品

[特長]

- ・コルチゾン酢酸エステル(副腎皮質ホルモン)とグリチルレチン酸配合の外用鎮痒・消炎薬で、発赤、発熱、はれの症状(炎症)をはやくおさえます。
- ・炎症の初期は、かゆみを伴います。
クロタミトンは、抗ヒスタミン薬や局所麻酔薬と異なり、かゆみ以外の皮膚感覚に影響を与えず鎮痒効果を発揮します。
- ・患部を掻くと症状が悪化し、細菌に感染しやすくなります。
イソプロピルメチルフェノールは、この細菌による二次感染を防ぎます。
- ・クリームタイプでのびがよく、べたつきがなくさっぱりしているので衣服などを汚すこともありません。
また、皮膚への浸透性がよいので、すみやかに作用し、優れた効果が期待できます。



使用上の注意

してはいけないこと



(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の部位には使用しないで下さい。

水痘(水ぼうそう)、みずむし・たむし等又は化膿している患部

2. 長期連用しないで下さい。

相談すること



1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談して下さい。

- (1)医師の治療を受けている人
- (2)本人又は家族がアレルギー体質の人
- (3)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (4)患部が広範囲の人
- (5)湿潤やただれのひどい人

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談して下さい。

(1)使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 ふ	発疹・発赤、かゆみ
皮 ふ (患部)	みずむし・たむし等の白癬症、にきび、化膿 症状、持続的な刺激感

(2)5～6日間使用しても症状がよくならない場合

効能・効果

湿疹、皮膚炎、ただれ、あせも、かぶれ、かゆみ、しもやけ、虫さされ、じんましん

用法・用量

1日2～3回 適量を患部に塗布して下さい。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)用法を守って下さい。
- (2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させて下さい。
- (3)目に入らないように注意して下さい。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗って下さい。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けて下さい。
- (4)外用にのみ使用して下さい。

成分・分量 100 g 中

コルチゾン酢酸エステル……………0.5 g

トコフェロール酢酸エステル……………0.5 g

クロタミトン……………5.0 g

グリチルレチン酸……………0.5 g

イソプロピルメチルフェノール……………0.3 g

添加物としてプロピレングリコール、セタノール、ミリスチン酸イソプロピル、ラウリル硫酸Na、ステアリン酸ソルピタン、エデト酸Na水和物、パラベン、香料、BHT、ステアリン酸グリセリン、ペヘン酸、ヘキシルデカノール、スクワラン、ジメチルポリシロキサン、ステアリン酸ポリオキシシル、ラウロマクロゴールを含有する。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管して下さい。特に高温になるような所（夏の車中など）には絶対に保管しないで下さい。
- (2)小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3)他の容器に入れ替えないで下さい。（誤用の原因になったり品質が変わります）
- (4)表示の期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。なお、表示の期限内であっても開封後は品質保持の点からなるべく早く使用して下さい。

お問い合わせ先

中新薬業株式会社 営業部

電 話 (076) 475-2121

受付時間 8:10～16:40（土、日、祝日を除く）



製造販売元

中新薬業株式会社

富山県滑川市上小泉504-2