



開封後はチャックをしめて保存してください。

消炎・鎮痛プラスター剤

サニックラン

第3類医薬品

10枚入 (7 cm × 10 cm)

使用方法

①



白い台紙を上にして、
折り曲げます。

②



中央部の台紙だけを
はがします。

③



両側の台紙はそのまま
中央部だけを患部に貼ります。

④



片方の台紙をはがし患部にのぼ
しながら貼り、最後にもう片方の
台紙をはがし患部に貼ります。

使用期限

製造番号

サニックラン 消炎・鎮痛プラスター剤

第3類医薬品

ご使用にあたって、この説明文書を必ずお読みください。必要なときに読めるように、大切に保管してください。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起りやすくなります)

次の部位には使用しないでください。

- (1) 目の周囲、粘膜等。
- (2) 湿疹、かぶれ、傷口。

🗨 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- (1) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

(2) 本品によりかぶれ等を起こしたことがある人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、痛み

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

〔成分・分量〕

本品の膏体100g(10000cm²)中

サリチル酸グリコール … 3.0 g

l-メントール …………… 6.0 g

ノニル酸ワニリルアミド … 0.01g

添加物として流動パラフィン、ポリブテン、メタクリル酸・アクリル酸ブチルコポリマー、ゴムラテックス、SBR合成ラテックス、BHT、ポリソルベート80を含有する。

〔効能・効果〕

打撲、捻挫、肩こり、腰痛、関節痛、筋肉痛、筋肉疲労、しもやけ、骨折痛

〔用法・用量〕

薬面の剥離紙をはがし、1日1～3回患部に貼ってください。

《用法・用量に関する注意》

- (1) 用法・用量を遵守してください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 貼った患部をコタツや電気毛布等で温めないでください。
- (4) 打撲、捻挫の場合には、ハレや熱がひいてから使用してください。
- (5) はがした直後に入浴すると、熱感で痛みを感じることもありますので、最低30分前にはがしてください。
- (6) 汗をかいたり、皮膚がぬれているときは、よく拭き取ってから使用してください。

〔保管及び取扱上の注意〕

- (1) 直射日光の当たらない、涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。)
- (4) 未使用分は袋のチャックをしっかりと締めて保管してください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

製造販売元 救急薬品工業株式会社

富山県射水市戸破32-7

お問い合わせ先: お客様相談窓口

電話番号 0766-56-9901

副作用救済制度
TEL 0120-149-931

10枚入(7cm×10cm)



N13H