

.....<キリトリ線>.....



開封後はチャックを閉めて保存してください。

## 消炎・鎮痛プラスター剤

# サニックラン

第3類医薬品

10枚入(7cm×10cm)

### 使用方法

①



透明フィルムを上にして、  
折り曲げます。

②



中央部のフィルムだけを  
はがします。

③



両側のフィルムはそのままで  
中央部だけを患部に貼ります。

④



片方のフィルムをはがし患部に  
のばしながら貼り、最後にもう  
片方のフィルムをはがし患部に  
貼ります。

使用期限

製造番号

# サニックラン 消炎・鎮痛プラスター剤

第3類医薬品

ご使用の前にこの説明文書を必ずお読みください。また必要なときに読めるよう保管してください。

## ⚠ 使用上の注意

### ☒ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1.次の部位には使用しないでください。

(1)目の周囲、粘膜等。

(2)湿疹、かぶれ、傷口。

### ☒ 相談すること

1.次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

(1)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

(2)本品によりかぶれ等を起こしたことがある人。

2.使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤・かゆみ・痛み

3.5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

## [成分・分量]

本品の膏体100g(10000cm<sup>2</sup>)中  
サリチル酸グリコール … 3.0 g      /メントール ………… 6.0 g

ノニル酸ワニリルアミド … 0.01g

添加物として流動パラフィン、ポリブテン、メタクリル酸・アクリル酸ブチルコポリマー、ゴムラテックス、SBR合成ラテックス、BHT、ポリソルベート80を含有します。

## [効能・効果]

打撲、捻挫、肩こり、腰痛、関節痛、筋肉痛、筋肉疲労、しもやけ

## [用法・用量]

薬面のフィルムをはがし、1日1~3回患部に貼ってください。

## 《用法・用量に関する注意》

(1)用法・用量を遵守してください。

(2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。

(3)貼った患部をコタツや電気毛布等で温めないでください。

(4)打撲、捻挫の場合には、ハレや熱がひいてから使用してください。

(5)はがした直後に入浴すると、熱感で痛みを感じることもありますので、最低30分前にはがしてください。

(6)汗をかいたり、皮膚がぬれているときは、よく拭き取ってから使用してください。

## [保管及び取扱い上の注意]

(1)直射日光の当たらない、涼しい所に保管してください。

(2)小児の手の届かない所に保管してください。

(3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。)

(4)未使用分は袋のチャックをしっかりと閉めて保管してください。

(5)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

製造販売元 救急薬品工業株式会社

富山県射水市戸破32-7

お問い合わせ先:お客様相談窓口

電話番号 0766-56-9901

副作用救済制度

TEL 0120-149-931

10枚入(7cm×10cm)

N22J

