この外箱は製品とともに保管し,使用の際には必ずお読みください.　外用鎮痛消炎剤 **サリエースA** 第3類医薬品

## ⚠ 使用上の注意

**☒ してはいけないこと**

（守らないと現在の症状が悪化したり，副作用が起こりやすくなる）

1.次の人は使用しないこと
天然ゴムによりアレルギー症状を起こしたことがある人.

2.次の部位には使用しないこと
(1)目の周囲，粘膜等．(2)湿疹，かぶれ，傷口.

**相談すること**

1.次の人は使用前に医師，薬剤師又は登録販売者に相談すること
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人.

2.使用後，次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので，直ちに使用を中止し，この外箱を持って医師，薬剤師又は登録販売者に相談すること

| 関係部位 | 症　状 |
|---|---|
| 皮　膚 | 発疹・発赤，かゆみ，痛み |

3.5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し，この外箱を持って医師，薬剤師又は登録販売者に相談すること

**効能又は効果**　腰痛，打撲（うちみ），捻挫，肩こり，関節痛，筋肉痛，筋肉疲労

**成分及び分量**　1㎡中

| | | | |
|---|---|---|---|
| サリチル酸メチル | 9.00g | *l*ーメントール | 4.50g |
| ノニル酸ワニリルアミド | 0.01g | *dl*ーカンフル | 1.80g |
| トコフェロール酢酸エステル（ビタミンE） | 0.50g | ハッカ油 | 1.20g |

添加物として，ポリブテン，生ゴム，ポリイソブチレン，エステルガム，テルペン樹脂，沈降炭酸カルシウム，酸化チタン，アクリル酸メチル・アクリル酸ー2ーエチルヘキシル共重合樹脂，ポリオキシエチレンノニルフェニルエーテル，天然ゴムラテックス，香料，赤色405号，黄色205号を含有します.

**用法及び用量**　1日1～2回，ライナーをはがし，患部に貼ってください.

〈用法及び用量に関連する注意〉

(1)用法及び用量を厳守してください．(2)小児に使用させる場合には，保護者の指導監督のもとに使用させてください．(3)貼った患部をコタツや電気毛布等で温めないでください．(4)汗をかいたり，患部がぬれている時は，よく拭き取ってから使用してください．(5)入浴時，温感成分による刺激を感じることがありますので，入浴の1時間前までには，はがしてください．(6)皮膚の弱い人は，使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に，1～2cm角の小片を目安として半日以上貼り，発疹・発赤，かゆみ，かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください．(7)皮膚の弱い人は，同じ部位に続けて貼らないでください.

紙

副作用被害救済制度 電話:0120-149-931（フリーダイヤル）

74mm×52mm 20枚入

価格 ¥550（10%税込）
[本体価格 ¥500]

セルフメディケーション 税 控除対象

〈発売元〉
株式会社 中京医薬品
愛知県半田市亀崎北浦町2-15-1

きずなASSIST
世界の子供たちに健康と教育を
国際貢献活動を支援します
この商品の売り上げの一部は「きずなASSIST基金」に寄付されます.

製造販売元 大協薬品工業株式会社
富山市水橋畠等173

---

# 肩腰

肩こり　腰 痛　関節痛

《貼り薬》サリエースA 第3類医薬品

T21

---

# 肩腰

肩こり　腰 痛

《貼り薬》
気孔付

第3類医薬品 サリエースA

■ こりと痛みを
緩和する消炎鎮痛プラスター

■ うす地でピッタリ

ソフト
な貼り心地

20枚

セルフメディケーション 税 控除対象

中京医薬品

---

肩腰

肩こり 腰 痛 関節痛

第3類医薬品 サリエースA

---

第3類医薬品
製造番号

サリエースA
配置期限

0206

2020 6017

---

[保管及び取扱い上の注意]

(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください.(2)小児の手の届かない所に保管してください.(3)他の容器に入れ替えないでください（誤用の原因になったり品質が変わります.）.(4)開封後は袋の口を折り曲げ，外箱に入れて保管してください.(5)配置期限を過ぎた製品は使用しないでください.

お問い合わせ先　大協薬品工業株式会社　お客様相談窓口
電話：076-479-1313　受付時間 9:00~17:00（土,日,祝日を除く）

4 514544 054994