

鎮痛・消炎外用薬

殿

年 月 日

(クールタイプ)

(10cm×14cm)×5枚入り

使用期限

製造番号

サロスリーA (クールタイプ)

(特長)

- ☆サロスリーAは、高分子ゲル基剤を使用しているため、従来のパップ剤に比べて接着力が向上し、患部への相着性にすぐれています。
- ☆サロスリーAは、夏期のダレ、冬期の膏体硬化現象がなく、柔軟な接着性を維持し、長時間の効果が期待できます。
- ☆サロスリーAは、伸縮性の高い不織布を採用し、患部にピッタリフィットし、従来のパップ剤に比べてお肌を少なくした微香性のパップ剤で使用感がさわやかです。
- ☆サロスリーAは、ヒトの肌に近いpH5で、肌に優しいです。また、グリチルリチン酸二カリウムを配合し、カブレを少なくしました。

ご使用前に次の説明を必ずお読みください。
また必要なときに読めるよう保管してください。

△ 使用上の注意

☒ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の部位には使用しないでください
 - (1) 目の周囲、粘膜等。
 - (2) 湿疹、かぶれ、傷口。

☒ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください
 - (1) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
 - (2) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (3) 本品によりかぶれ等を起こしたことがある人。
2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師又は薬剤師に相談してください
 - (1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

- (2) 5～6日間使用しても症状がよくならない場合

〔成分・分量〕 本品の膏体100g中

サリチル酸エチレングリコール……………0.5g
 α-メントール……………0.3g
 d-カンフル……………0.2g
 ハッカ油……………0.2g
 グリチルリチン酸二カリウム……………0.02g
 添加物としてカオリン、酸化チタン、ゼラチン、D-ソルビトール、メタクリル酸・アクリル酸ブチルコポリマー、アクリル酸デンプン、1,3-ブチレングリコール、ポリアクリル酸Na、水酸化Al/Mg、オレイン酸ソルビタン、ポリソルベート80、pH調整剤、メタリン酸Na、チモールを含有する。

〔効能・効果〕

打撲、ねんざ、腰痛、肩こり、筋肉痛、筋肉疲労、関節痛、しもやけ、骨折痛

〔用法・用量〕

患部のフィルムをはがし、1日1～3回患部に貼ってください。

＜用法・用量に関連する注意＞

- (1) 用法・用量を遵守してください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 汗をかいたり、皮膚がぬれているときは、よく拭き取ってから使用してください。

〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1) 直射日光の当たらない、涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)
- (4) 使用後は袋の切り口を折りまげて、外気にふれないように保存してください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

発 売 元



メディカル東京 株式会社

〒340-0815 埼玉県八潮市八潮5-12-5

お問い合わせ先：TEL. 048(995)3061(代)

FAX. 048(995)9647

製造販売元

救急薬品工業株式会社

〒939-0351 富山県射水市戸破32番地7



鎮痛・消炎外用薬

殿

年 月 日

(クールタイプ) (20cm×14cm) × 5枚入り 使用期限 製造番号

サロスリーA (クールタイプ)

〔特長〕

- ☆サロスリーAは、高分子ゲル基剤を使用しているため、従来のパップ剤に比べて接着力が向上し、患部への相着性にすぐれています。
- ☆サロスリーAは、夏季のダレ、冬季の膏体硬化現象がなく、柔軟な接着性を維持し、長時間の効果が期待できます。
- ☆サロスリーAは、伸縮性の高い不織布を採用し、患部にピッタリフィットし、従来のパップ剤に比べてにおいを少なくした微香性のパップ剤で使用感がさわやかです。
- ☆サロスリーAは、ヒトの肌に近いpH5で、肌に穏やかです。また、グルチルリチン酸ニカリウムを配合し、カブレを少なくしました。

ご使用前に次の説明を必ずお読みください。
また必要なときに読めるよう保管してください。

△ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

次の部位には使用しないでください

- (1) 目の周囲、粘膜等。
- (2) 湿疹、かぶれ、傷口。



■ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (2) 薬によりアレルギー症状を起こしたことのある人。
- (3) 本品によりかぶれ等を起こしたことのある人。

2. 次の場合は、ただちに使用を中止し、この製品を持って医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

- (2) 5～6日間使用しても症状がよくなりえない場合

〔成分・分量〕 本品の膏体100g中

サリチル酸エチレングリコール	0.5g
l-メントール	0.3g
d-カンフル	0.2g
ハッカ油	0.2g
グリチルリチン酸ニカリウム	0.02g

添加物としてカオリン、酸化チタン、ゼラチン、D-ソルビトール、メタクリル酸・アクリル酸ブチルコポリマー、アクリル酸デンプン、1,3-ブチレングリコール、ポリアクリル酸Na、水酸化Al/Mg、オレイン酸ソルビタン、ポリソルベート80、pH調整剤、メタリン酸Na、チモールを含有する。

〔効能・効果〕

打撲、ねんざ、腰痛、肩こり、筋肉痛、筋肉疲労、関節痛、しもやけ、骨折痛

〔用法・用量〕

薬面のフィルムをはがし、1日1～3回患部に貼ってください。

＜用法・用量に関連する注意＞

- (1) 用法・用量を遵守してください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 汗をかいたり、皮膚がぬれているときは、よく拭き取ってから使用してください。

〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1) 直射日光の当たらない、涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)
- (4) 使用後は袋の切り口を折りまげて、外気にふれないように保存してください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

発売元



メディカル東京 株式会社

〒340-0815 埼玉県八潮市八潮5-12-5

お問い合わせ先: TEL. 048(995)3061(代)

FAX. 048(995)9647

製造販売元

救急薬品工業株式会社

〒939-0351 富山県射水市戸破32番地7

