

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。また、必要なときに読めるように大切に保管してください。

鎮痛消炎プラスター サロンパス®ロール®

第3類医薬品

⚠〔使用上の注意〕

⊗ してはいけないこと

〔守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。〕

次の部位には使用しないでください。

(1) 目の周囲、粘膜等。(2) 湿疹、かぶれ、傷口。



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、色素沈着、皮膚はく離

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

【効能・効果】 筋肉痛、筋肉疲労、肩こり、腰痛、関節痛、打撲、ねんざ、骨折痛、しもやけ

【用法・用量】 1日数回適当な長さに切り、患部に貼付してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) テーピングや固定用として使用しないでください。
- (2) 広範囲の使用を避けてください。
- (3) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (4) 皮膚の弱い人は同じ所には続けて貼らないでください。
- (5) 患部の皮膚は清潔にして貼ってください。

【成分・分量】

成 分	含 量（膏体100g中）	はたらき
サリチル酸グリコール	5.56g	炎症や痛みをおさえます。
ℓ-メントール	5.56g	痛みをおさえます。

添加物として、アクリル酸デンプン、ケイ酸Al、水添ロジングリセリンエステル、スチレン・イソブレン・スチレンブロック共重合体、BHT、ポリイソブチレン、流動パラフィン、その他1成分を含有します。

保管及び取り扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください（誤用の原因になったり、品質が変わることがあります）。
- (4) 開封後は袋の口を折りまげ、箱に入れて保管してください。

▼本商品についてのお問い合わせは、お買い求めの薬局・薬店、又は下記の「お客様相談室」までお願い申し上げます。

製造販売元  **久光製薬株式会社** 〒841-0017 鳥栖市田代大官町408

お客様相談室： ☎ **0120-133250**

受付時間：9:00～12:00、13:00～17:50（土、日、祝日を除く）