



シートハップP

(外用鎮痛消炎薬) 第3類医薬品

うちみ・ねんざ・筋肉痛・肩こり・腰痛

スポーツのあとに



● はがしぐちテープを取り除いて貼ってください。



使用期限

製造番号

⚠ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

次の部位には使用しないこと

(1) 目の周囲, 粘膜等. (2) 湿疹, かぶれ, 傷口.



相談すること

1. 次の人は使用前に医師, 薬剤師又は登録販売者に相談すること
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人.

2. 使用後, 次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので, 直ちに使用を中止し, この外袋を持って医師, 薬剤師又は登録販売者に相談すること

| 関係部位 | 症 状 |
|------|------------|
| 皮 膚 | 発疹・発赤, かゆみ |

3. 5~6日間使用しても症状がよくなるしない場合は使用を中止し, この外袋を持って医師, 薬剤師又は登録販売者に相談すること

成分及び分量 膏体 100.0g中

dl-カンフル.....0.200 g

l-メントール.....0.300 g

サリチル酸グリコール.....1.000 g

トコフェロール酢酸エステル.....0.300 g

添加物として, D-ソルビトール液, 濃グリセリン, ポリアクリル酸部分中和物, セラチン, カオリン, カルメロースナトリウム, 酸化チタン, カルボキシビニルポリマー, ポリソルベート80, pH調整剤, ジヒドロキシアルミニウムアミノアセテート, モノオレイン酸ソルビタン, 香料を含有します。

製造販売元



大協薬品工業株式会社

富山市水橋畠等173

効能又は効果

腰痛, 打撲(うちみ), 捻挫, 肩こり, 関節痛, 筋肉痛, 筋肉疲労

用法及び用量

1日1~2回, 膏面のライナーをはがし, 患部に貼ってください。

〈用法及び用量に関連する注意〉

- (1) 用法及び用量を厳守してください。
- (2) 小児に使用させる場合には, 保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 粘着テープ等でかぶれやすい人は使用しないでください。
- (4) 汗をかいたり, 患部がぬれているときは, よく拭き取ってから使用してください。
- (5) 多量の汗をかくことが予想される場合は, 膏体がやわらかくなりすぎる可能性があるため, 使用を控えてください。

〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください (誤用の原因になったり品質が変わります)。
- (4) 開封後は袋の口を折り曲げて保管してください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

お問い合わせ先

大協薬品工業株式会社

お客様相談窓口

電話 076-479-1313

受付時間 9:00~17:00 (土, 日, 祝日を除く)

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-9311

6枚入 (11.9cm×7.7cm)

T21