

ご使用に際しては、この説明
文書を必ず読んでください。
また、必要なときに読めるよ
う大切に保存してください。

外 傷 治 療 剤

シカポン®

〈シカポン〉は各種化膿菌に対し殺菌作用のある
アクリノールや、広範囲の細菌に抗菌力のあるス
ルファジアジンを主成分とし、更に肉芽の発生や
表皮の形成を促進させるビタミンD₂を配合してい
ます。また基剤として、患部の分泌物をよく吸着
するポリエチレングリコール軟膏を使用していま
すので、二次感染を防ぎ患部の治癒をより早める
効果があります。



使用上の注意



相談すること

- 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談して
ください
 - 今までに薬や化粧品等によるアレルギー症
状（例えば、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ
等）を起こしたことがある人。
 - 患部が広範囲の人。
 - 湿疹やただれのひどい人。
 - 深い傷やひどいやけどの人。
 - 医師の治療をうけている人。
 - 本人又は家族がアレルギー体質の人。
- 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書
を持って医師又は薬剤師に相談してください
 - 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、はれ

- 5～6日間使用しても症状がよくなりません

【成分・分量】 (100g中)

スルファジアジン	5.0g
アクリノール	0.1g
ビタミンD ₃	0.35mg

その他、添加物として
ポリエチレングリコール、香料を含有する。

【効 能】

やけど、きり傷、擦過傷、おでき、とびひ

【用 法】

- 1日1～2回適量を取り患部に塗布するか、ガーゼに延ばして貼付してください。
- 分泌物の多いときは本品の適量を塗りつけ、その上にガーゼを重ねて吸い取らせ、1日2～3回ガーゼを取換えてください。

【用法に関する注意】

- (1) 目にはいらないように注意してください。
万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い、症状が重い場合には眼科医の診療を受けてください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 外用にのみ使用してください。
- (4) 定められた用法を守ってください。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります)
- (4) 使用期限の過ぎた製品は使用しないでください。

【備 考】

シカポンは家庭の常備薬です。やけど、きり傷、擦過傷、おでき、とびひにすぐ間に合うシカポンをぜひ御愛用ください。

〈お問い合わせ先〉

本剤のご使用により、変わった症状があらわれるなど、何かお気付きの点がございましたら、お買い求めの薬局、薬店又は下記会社「相談窓口」までご連絡頂きますようお願い申し上げます。

製造販売元： **松田薬品工業株式会社**
愛媛県松山市河野中須賀318
電話 (089)994-1333

受付時間 8:30～17:00
(土、日、祝日を除く)