



第2類医薬品

ご使用に際しては、この説明
文書を必ず読んでください。
また、必要なときに読めるよ
う大切に保存してください。

外傷治療剤 シカボン®

〈シカボン〉は各種化膿菌に対し殺菌作用のある
アクリノール水和物や、広範囲の細菌に抗菌力のある
スルファジアジンを主成分とし、更に肉芽の
発生や表皮の形成を促進させるビタミンD₂を配合
しています。また基剤として、患部の分泌物をよく
吸着するポリエチレングリコール軟膏を使用し
ていますので、二次感染を防ぎ患部の治癒をより
早める効果があります。

⚠ 使用上の注意

■ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談して
ください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (4) 患部が広範囲の人。
- (5) 湿潤やただれのひどい人。
- (6) 深い傷やひどいやけどの人。

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書
を持って医師又は薬剤師に相談してください

(1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ

(2) 5～6日間使用しても症状がよくなる場合

【成分・分量】 (100g中)

スルファジアジン	5.0g
アクリノール水和物	0.1g
ビタミンD ₂	0.35mg

その他、添加物として
ポリエチレングリコール、香料を含有する。

【効 能】

やけど、きりきず、すりきず、あでき、とびひ

【用 法 ・ 用 量】

1日1～2回適量を患部に塗布するかガーゼ等にはば
して貼付してください。

【用法・用量に関する注意】

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督
のもとに使用させてください。
- (2) 目にはいらないように注意してください。
万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬる
ま湯で洗い、症状が重い場合には眼科医の診療
を受けてください。
- (3) 外用にのみ使用してください。
- (4) 分泌物の多いときは本品の適量を塗りつけ、そ
の上にガーゼを重ねて吸い取らせ、1日2～3
回ガーゼを取換えてください。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に
密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原
因になったり品質が変わります)
- (4) 使用期限の過ぎた製品は使用しないでください。

【備 考】

シカボンは家庭の常備薬です。やけど、きりきず、すり
きず、あでき、とびひにすぐに関合うシカボンをぜひ御
愛用ください。

〈お問い合わせ先〉

本剤のご使用により、変わった症状があらわれる
など、何かお気付きの点がございましたら、お買
い求めの薬局、薬店又は下記会社「相談窓口」まで
ご連絡頂きますようお願い申し上げます。

製造販売元： **松田薬品工業株式会社**

愛媛県松山市河野中須賀318

電話 (089) 994-1333

受付時間 8:30～17:00
(土、日、祝日を除く)