

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読み下さい。
また、必要ときに読めるよう大切に保管して下さい。

虫さされ、しっしん、かゆみ、じんましんに

スキントールS

第3類医薬品

カ、ノミ、イエダニなどの虫に刺されると、刺されたところが赤く腫れてかゆみや痛みが起きます。これは、ヒスタミン、セロトニン、アセチルコリンなどの化学物質によって引き起こされるアレルギー反応の一種です。

本剤にはヒスタミンの遊離を抑える作用を持ったジフェンヒドラミンや、かゆみ、痛みを和らげるサリチル酸メチルなどの成分を配合しております。

虫に刺されたとき、患部をかくと、余計にかゆみが増し、腫れや痛みが強くなります。スキントールSを塗って、そっとしておくのがいいでしょう。

スキントールSは、ステロイド剤は配合しておりませんので、お子様からお年寄りまで、安心してご使用いただけます。

⚠ 使用上の注意

相談すること



1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (4) 湿潤やただれのひどい人。

2. 次の場合は直ちに使用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること

- (1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関 係 部 位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ

- (2) 5～6日間使用しても症状がよくなる場合

《効能又は効果》

かゆみ、虫さされ、湿疹、じんましん

《用法及び用量》

患部を清潔にしたのち、1日2～3回適量をすりこむ。又は症状に応じてガーゼに適量を塗布して患部に貼付する。

《用法及び用量に関連する注意》

- (1) 定められた用法・用量を守ること。
- (2) 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。
- (3) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- (4) 外用にのみ使用すること。

《成分及び分量》本品100g中

ジフェンヒドラミン	1.0g
ℓ-メントール	5.0g
dℓ-カンフル	6.0g
サリチル酸メチル	3.0g

(添加物として、サラシミツロウ、セタノール、プロピレングリコール、流動パラフィン、ステアリン酸グリセリン、自己乳化型ステアリン酸グリセリン、ラウロマクロゴール、ポリソルベート60、ラノリン、トコフェロール酢酸エステル、キサンタンガム、パラベンを含有する。)

《保管及び取扱い上の注意》

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)

本剤についてのお問い合わせは、お買い求めのお店または下記までご連絡ください。

〒634-0815 奈良県橿原市大谷町182番地
株式会社 雪の元本店 お客様相談室
受付時間 9:00~12:00 13:00~17:00
(土曜、日曜、祝日を除く)
TEL 0744-22-2440 FAX 0744-22-2406

製造販売元 株式会社 **雪の元本店**
奈良県橿原市大谷町182番地