

ご使用に際して、この説明文書をよくお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

第3類医薬品

外用鎮痛消炎薬

ZENOL

肩こり、筋肉の疲労に

ゼノールチックE

本剤の特長

- サリチル酸メチルが患部に浸透して、肩こり、筋肉の疲労に効きます。
- 直ぬりチックタイプだから、ぬりやすく、手を汚しません。
- べたつかないので、すぐ服を着ることがができます。
- 清涼感のある香りです。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

次の部位には使用しないでください。

- (1) 目の周囲、粘膜等
- (2) 湿疹、かぶれ、傷口



相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください。

- (1) 本人又は家族がアレルギー体質の人
- (2) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。

- (1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

- (2) 5～6日間使用しても、症状がよくなる場合

効能・効果

肩こり、筋肉疲労、筋肉痛、腰痛、関節痛、打撲、捻挫(ねんざ)、骨折痛、しもやけ

(裏面へ続く)

用法・用量

通常、1日1～数回、適量を患部にすり込んでください。

＜使い方＞

図のように容器の底部のダイヤルを回し、薬剤を4～5mm出して使用してください。

＜用法・用量に関連する注意＞



- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 目に入らないようご注意ください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (3) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (4) 本剤は外用にのみ使用し、内服しないでください。
- (5) 患部の汗をふきとってから使用してください。
- (6) 容器が直接患部に当たらないように、容器の中の薬剤を4～5mm出してから使用してください。
- (7) 薬剤底部の受け皿が見え、ガタつくようになったら、本剤の使用をやめてください。また、受け皿に残った薬剤は無理に使用しないでください。

成分

●100g中

成分	含量
サリチル酸メチル	17.50g
l-メントール	6.00g
dl-カンフル	5.00g
グリチルレチン酸	0.02g

添加物として、イソプロパノール、香料、ステアリン酸Na、グリセリン、ヒマシ油を含有します。



保管及び取扱い上の注意

- (1) 本剤を火気に近づけないでください。また、使用後は火中に投じないでください。
- (2) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (3) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (4) 揮発性がありますので、使用後はキャップをきちんと閉めて、外気にふれないようにしてください。
- (5) 他の容器に入れかえないでください。（誤用の原因になったり品質が変わります。）
- (6) 合成樹脂、塗料（家具、塗装床、アクセサリ等）、化繊、絹、皮革等に付着すると変質することがありますので、ご注意ください。
- (7) 使用期限が過ぎた製品は、使用しないでください。また、開封後は使用期限内であっても品質保持の点からなるべく速やかに使用してください。

内容量

33g

お問い合わせ先

お問い合わせはお買い求めのお店又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

連絡先 大鵬薬品工業株式会社 お客様相談室

〒101-8444 東京都千代田区神田錦町1-27

電話番号：03-3293-4509 受付時間：9:00～17:30（土、日、祝日を除く）

ホームページ：<http://www.taiho.co.jp/>

副作用被害救済制度のお問い合わせ先（独）医薬品医療機器総合機構

<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai> 電話 0120-149-931（フリーダイヤル）

販売元



大鵬薬品工業株式会社
東京都千代田区神田錦町1-27



製造販売元

三井製薬株式会社
東京都練馬区豊玉北2-3-1