

第3類医薬品

ゼノールチックE

広くグリッとぬれる
スリムチック

ZENOL ZENOL

ゼノール

チックE

ハードゲル

肩こり・ 筋肉痛に 効く



外用鎮痛消炎薬

サリチル酸 メチル 配合

携帯に便利 スリムチック

販売名：ゼノールチックE

第3類医薬品



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)
次の部位には使用しないでください。

- (1) 目の周囲、粘膜等
- (2) 湿疹、かぶれ、傷口



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人

2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

3.5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

保管及び取扱い上の注意

(1) 本剤を火気に近づけないでください。また、使用後は火中に投じないでください。(2) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。(3) 小児の手の届かない所に保管してください。(4) 揮発性がありますので、使用後はキャップをきちんと閉めて、外気にふれないようにしてください。(5) 他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)(6) 合成樹脂、塗料(家具、塗装床、アクセサリー等)、繊維、絹、皮革等に付着すると変質することがありますので、ご注意ください。(7) 使用期限が過ぎた製品は、使用しないでください。また、開封後は使用期限内であっても品質保持の点からなるべく速やかに使用してください。



4 987117 372052

製造番号

使用期限

MXY9C2

サリチル酸メチルが 患部に浸透して効きます。

こんな毎日の肩こり、筋肉痛、
筋肉疲労に効きます。



毎日の肩こりに



家事などによる
肩こりに



筋肉の疲労に

底部のダイヤルを回すと〈薬剤〉が出てきます。
4~5mm出して使用してください。

引火性固体
サリチル酸メチル、
イソプロパノール



販売元

大鵬薬品工業株式会社
東京都千代田区神田錦町1-27
お客様相談室 TEL.03-3293-4509
<http://www.taiho.co.jp/>

製造販売元



三笠製薬株式会社
東京都練馬区豊玉北2-3-1

®:登録商標

副作用被害救済制度
電話 0120-149-931

ご使用に際して、このパッケージに記載の説明書をよくお読みください。また、必要なときに読めるように大切に保管してください。

効能・効果

肩こり、筋肉疲労、筋肉痛、腰痛、関節痛、打撲、捻挫(ねんざ)、骨折痛、しもやけ

用法・用量

通常、1日1~数回、適量を患部にすり込んでください。

〈用法・用量に関連する注意〉

(1)用法・用量を厳守してください。(2)目に入らないようご注意ください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。(3)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。(4)本剤は外用にのみ使用し、内服しないでください。(5)患部の汗をふきとってから使用してください。(6)容器が直接患部に当たらないように、容器の中の薬剤を4~5mm出してから使用してください。(7)薬剤底部の受け皿が見え、ガタつくようになったら、本剤の使用をやめてください。また、受け皿に残った薬剤は無理に使用しないでください。

成分(100g中)

成分	含量
サリチル酸メチル	17.50g
l-メントール	6.00g
dl-カンフル	5.00g
グリチルレチン酸	0.02g

添加物として、イソプロパノール、香料、ステアリン酸Na、グリセリン、ヒマシ油を含有します。

内容量

33g



箱



袋: PE, PET, 金属

11D204