


タイヨーパップE

第3類医薬品 (外用鎮痛消炎薬)



●はがしぐちテープ
を取り除いて貼
ってください。

使用期限

製造番号

△ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起りやすくなる)

次の部位には使用しないこと

(1)目の周囲、粘膜等。(2)湿疹、かぶれ、傷口。



■ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この外袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この外袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

成分及び分量 膏体100g中

dl-カンフル0.200g

l-メントール0.300g

サリチル酸グリコール1.000g

トコフェロール酢酸エステル0.300g

添加物として、D-ソルビトール液、濃グリセリン、ポリアクリル酸部分中和物、ゼラチン、カオリン、カルメロースナトリウム、酸化チタン、カルボキシビニルポリマー、ポリソルベート80、pH調整剤、ジヒドロキシアルミニウム アミノアセテート、モノオレイン酸ソルビタン、香料を含有します。

製 造
販売元



大協薬品工業株式会社

富 山 市 水 橋 5 等 1 7 3

効能又は効果

打撲、捻挫、筋肉痛、肩こり、関節痛、骨折痛、腰痛、筋肉疲労

用法及び用量

1日1～2回、膏面のライナーをはがし、患部に貼ってください。

〈用法及び用量に関連する注意〉

- (1)用法及び用量を厳守してください。
- (2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3)粘着テープ等でかぶれやすい人は使用しないでください。
- (4)汗をかいたり、患部がぬれているときは、よく拭き取ってから使用してください。
- (5)多量の汗をかくことが予想される場合は、膏体がやわらかくなりすぎる可能性があるため、使用を控えってください。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になつたり品質が変わります。).
- (4)開封後はファスナーを閉めて保管してください。
- (5)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

お問い合わせ先

大協薬品工業株式会社

お客様相談窓口

電話:076-479-1313

受付時間 9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構

http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html

電話:0120-149-931(フリーダイヤル)

6枚入(11.8cm×7.5cm)

希望小売価格900円+税



T12