

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時読めるよう大切に保管してください。



鎮痒消炎薬 タクト®プラスクリーム

かゆみ、虫さされに

タクトプラスクリームは…

- 炎症、赤み、はれを抑えます
酢酸デキサメタゾンが虫さされやしっしんによる炎症、赤み、はれを抑えます。
- かゆみを抑えます
クロタミトン、塩酸ジブカイン、塩酸ジフェンヒドラミンの3種類の成分がしっしんや虫さされによるかゆみを抑えます。また、殺菌剤イソプロピルメチルフェノールが、かきこわしによる二次感染を防ぎます。
- べたつかず、目立たない
べたつかず、目立たない、刺激の少ないクリームです。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の部位には使用しないでください
水痘(水ぼうそう)、みずむし・たむし等又は化膿している患部。
2. 長期連用しないでください



相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師にご相談ください
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
 - (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (4) 患部が広範囲の人。
 - (5) 湿潤やただれのひどい人。
2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師にご相談ください
 - (1) 使用後、次の症状があらわれた場合



関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ
皮膚(患部)	みずむし・たむし等の白癬症、にきび、化膿症状、持続的な刺激感

- (2) 5～6日間使用しても症状がよくならない場合

【効 能】

かゆみ、虫さされ、湿疹、かぶれ、皮ふ炎、あせも、ただれ、しもやけ、じんましん

【用法・用量】

1日数回適量を患部に塗布します。

【用法・用量に関連する注意】

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。
なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (4) 外用にのみ使用してください。

【成分・分量と働き】

成 分	分 量	働 き
酢酸デキサメタゾン	0.025%	湿疹、皮ふ炎、かぶれなどの炎症、赤み、はれを抑えます。
クロタミトン	5.0%	
塩酸ソフェンヒドラミン	1.0%	かゆみを抑えます。
塩酸ソブカイン	0.3%	
イソプロピルメチルフェノール	0.1%	殺菌作用により細菌による感染を防ぎます。
<i>l</i> -メントール	3.5%	
<i>dl</i> -カンフル	3.0%	

添加物として、ステアリン酸ソルピタン、セトステアリルアルコール、自己乳化型ステアリン酸グリセリン、テトラオレイン酸ポリオキシエチレンソルピット、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、オクチルドデカノール、流動パラフィン、パラベン、水添大豆リン脂質、ヒドロキシエチルセルロース、パルミチン酸デキストリンを含有します。

◎保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。)
- (4) 使用期限をすぎた製品は、使用しないでください。



本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記をお願い申し上げます。

佐藤製薬株式会社 お客様相談窓口

電話 03(5412)7393

受付時間:9:00~18:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元

佐藤製薬株式会社

東京都港区元赤坂1丁目5番27号