



sato

セルフメディケーションをサポートします
HEALTHCARE INNOVATION

2013年3月 記載要領変更に伴う改訂

第2類
医薬品

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。また、必要な時読めるよう大切に保管してください。



鎮痒消炎薬

タクトホワイトL

あせも・かゆみに

タクトホワイトLは…

- あせも、虫さされなどにすぐれた効きめがあります。
- かゆみを抑え、かぶれを鎮めます。
- 患部を乾かし、治りを早めます。
- 清涼感のある白色リニメント剤です。

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(3) 湿潤やただれのひどい人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください



関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください

〔効 能〕

あせも、かゆみ、虫さされ、じんましん、湿疹、皮膚炎、かぶれ、しもやけ、ただれ

〔用法・用量〕

1日数回、患部に適量を塗布します。

〔用法・用量に関連する注意〕

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (4) 外用にのみ使用してください。

〔成分・分量と働き〕

成 分	分 量	働 き
ジフェンヒドラミン	1.0%	かゆみ、かぶれを抑えます。
<i>dl</i> -メチルエフェドリン塩酸塩	0.5%	
リドカイン	0.5%	
グリチルリチン酸二カリウム	0.5%	あせも、じんましんなどの炎症を鎮めます。
イソプロピルメチルフェノール	0.1%	殺菌作用により細菌による悪化を防ぎます。
酸化亜鉛	12.5%	収れん作用と分泌物を吸着して患部を乾燥することにより治りを助けます。

添加物として、ハッカ油、ポリソルベート80、CMC-Na、クエン酸Na、香料(*l*-メントール、チモールを含む)を含有します。

◎保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。)
- (4) 酸化亜鉛が配合されているため塗布部が白くなります。
- (5) 使用期限をすぎた製品は、使用しないでください。



◎あせものお手当のアドバイス

1. できるだけ汗をかかないようにしましょう。汗をかかないことが最大の予防法です。
2. 汗をかいたら清潔なぬれたタオルで皮ふをこすらないようにふきましょう。
3. 通気性のよい下着を着るようにしましょう。また、汗をかいたらこまめに下着をかえましょう。

副作用被害救済制度のお問い合わせ先
(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。
佐藤製薬株式会社 お客様相談窓口
電話 03(5412)7393
受付時間：9:00～17:00 (土、日、祝日を除く)

製造販売元
佐藤製薬株式会社
東京都港区元赤坂1丁目5番27号