

Tamitoor Pas

ZENEL

肩のこり
腰の痛み
神経痛

ビタミンE配合
肌色・穴あき はり薬

タミトールパスE判

78枚入
(7.4cm×5.2cm)

タミトールパスE判

肩のこり・腰の痛み

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

第3類医薬品

開き口

販売名 タミトールパスN1

効能・効果

腰痛、打撲、捻挫、肩こり、関節痛、筋肉痛、筋肉疲労、しもやけ、骨折痛

用法・用量

1日1～2回、ライナーをはがし、患部にはってください。

＜用法及び用量に関連するご注意＞

(1)用法及び用量を厳守してください。

(2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。

(3)汗をかいたり、患部がぬれている時は、よくふき取ってから使用してください。

(4)皮膚のとくに弱い人は、同じ部位に続けて貼ることをさけてください。

(5)皮膚の弱い人は、使用前に小片を腕の内側に半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。

(6)貼った患部をコタツや電気毛布等で温めないでください。

成分・分量 1.0ml中

dl-カンフル…1.8g トーメントール…4.5g サリチル酸メチル…9.0g ハッカ油…1.2g

トコフェロール酢酸エステル(ビタミンE)…0.5g ノニル酸ワリルアミド…0.01g

添加物:ポリブテン、生ゴム、ポリソフチレン、エステルガム、テルペン樹脂、炭酸Ca、酸化チタン、アクリル酸メチル・アクリル酸-2-エチルヘキシルコポリマー、ポリオキシエチレンノニルフェニルエーテル、コムラテックス、赤色405号、黄色205号、香料

△ 使用上の注意

☒ **してはいけないこと**

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1.次の人は使用しないでください。

天然ゴムによるアレルギー症状を起こしたことがある人。

2.次の部位には使用しないでください。

(1)目の周囲、粘膜等。(2)発疹、かぶれ、傷口。

■ **相談すること**

1.次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください。

(1)本人又は家族がアレルギー体質の人。

(2)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2.次の場合は、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師又は薬剤師に相談してください。

(1)使用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、痛み

(2)5～6日間使用しても症状がよくならない場合。

保管及び取扱い上の注意

(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。

(2)小児の手の届かない所に保管してください。

(3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わります。)

(4)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

包装 78枚 (7.4cm×5.2cm×26枚)×3袋

お客様相談窓口



発売元 **ゼネル薬品工業株式会社**

大阪市北区天満3丁目6番1号

電話：06-6352-2381

受付時間：9時から17時まで(土、日、祝日を除く)

製造販売元

株式会社 廣昌堂 富山県射水市水戸田2841

紙箱

内袋

使用期限

製造番号

肩のこり・腰の痛み

タミトールパスE判