

貼り薬

トクホン

炎症を抑える

清涼感を与え痛みをやわらげる

グリチルレチン酸

l-メントール dl-カンフル

炎症を抑え痛みを鎮める

血行をよくし痛みをやわらげる

サリチル酸メチル

ビタミンE酢酸エステル

5種の有効成分が効く

140枚

第3類医薬品

第3類医薬品

セルフメディケーション
税 控除 対象

- 肌にやさしい貼りごち
- はがれにくい
- スマホ使用で肩こりの方にも

1枚サイズ 4.2cm×6.5cm



5種の有効成分が効く

サリチル酸メチル
グリチルレチン酸
ビタミンE
l-メントール
dl-カンフル

使いやすい小さめサイズ

肩こり・腰痛・筋肉疲労に

トクホン

TOKUHON

大正製薬

140枚

トクホン

外用鎮痛消炎薬

第3類医薬品

140枚

成分及び分量

<有効成分 膏体100g(0.54m²)中>

成分	分量	はたらき
サリチル酸メチル	7.3g	炎症を抑え痛みを鎮める
グリチルレチン酸	0.18g	炎症を抑える
ビタミンE酢酸エステル	1.35g	血行をよくし痛みをやわらげる
l-メントール	6.5g	清涼感を与え痛みをやわらげる
dl-カンフル	1.1g	

添加物として酸化亜鉛、ジブチルピロキシトリン、生ゴム、ポリインブレン、エステルガム、その他2成分を含有します。

副作用被害救済制度お問い合わせ先
(独)医薬品医療機器総合機構
https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html
0120-149-931

発売元

大正製薬株式会社
東京都豊島区高田3丁目24番1号
<https://www.taisho.co.jp/>

製造販売元

株式会社トクホン
東京都豊島区高田3丁目26番3号

お客様119番室

電話 03-3985-1800

※受付時間は、大正製薬ホームページにてご確認ください

ご使用に際してこの説明書を必ずお読みください。また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

ここを開けてください

特長

- 1 肩こり・腰痛・筋肉疲労に5種の有効成分が効く
- 2 2枚1組で、使いやすい小さめサイズ
- 3 肌にやさしい貼りごち
- 4 四スミが丸く、はがれにくい

△使用上の注意

- してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用がおこりやすくなる)

 1. 次の部位には使用しないこと
 - 1) 目の周囲、粘膜など
 - 2) 湿疹、かぶれ、傷口
- 相談すること
 1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - ・薬などによりアレルギー症状をおこしたことがある人
 2. 使用后、皮膚に発疹・発赤、かゆみ、かぶれなどの症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書をもって医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明書をもって医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

効能又は効果

肩こり、腰痛、筋肉痛、筋肉疲労、関節痛、打撲、捻挫、しもやけ

用法及び用量

薬剤面をおおったはく離紙をはがし、1日数回患部に貼付してください。

- 1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。また、刺激が強く感じられることがあるため、7才未満の人への使用はさけてください。
- 2) 患部を清潔にしてから使用してください。
- 3) 皮膚の弱い人は同じ所に続けて使用しないでください。
- 4) 使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に小片を貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれなどの症状がおきないことを確かめてから使用してください。

保管及び取扱い上の注意

- 1) 直射日光をさけ、涼しい所に保管してください。
- 2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- 3) 開封後は早めに使用してください。
- 4) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)
- 5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

内容量

140枚入(20枚入×7袋) <1枚サイズ 4.2cm×6.5cm>