


# パップクール

(外用鎮痛消炎薬) 第3類医薬品

ワンタッチタイプ  
ネット+パップをドッキング



● はがしぐちテープを取り除いて貼ってください。



使用期限

製造番号

## ⚠ 使用上の注意

### ❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)  
次の部位には使用しないこと  
(1) 目の周囲, 粘膜等. (2) 湿疹, かぶれ, 傷口.



### 相談すること

- 次の人は使用前に医師, 薬剤師又は登録販売者に相談すること  
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人.
- 使用后, 次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので, 直ちに使用を中止し, この外袋を持って医師, 薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤, かゆみ

- 3.5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し, この外袋を持って医師, 薬剤師又は登録販売者に相談すること

### 成分及び分量 膏体100.0g中

dl-カンフル .....0.200g  
l-メントール .....0.300g  
サリチル酸グリコール .....1.000g  
トコフェロール酢酸エステル(ビタミンE) .....0.300g

添加物として, D-ソルビトール液, 濃グリセリン, ポリアクリル酸部分中和物, ゼラチン, カオリン, カルメロースナトリウム, 酸化チタン, カルボキシビニルポリマー, ポリソルベート80, pH調整剤, ジヒドロキシアルミニウム アミノアセテート, モノオレイン酸ソルビタン, 香料を含有します。

製造販売元  大協薬品工業株式会社  
富山市水橋島等173

### 効能又は効果

腰痛, 打撲(うちみ), 捻挫, 肩こり, 関節痛, 筋肉痛, 筋肉疲労

### 用法及び用量

1日1~2回, 膏面のライナーをはがし, 患部に貼ってください。

### <用法及び用量に関連する注意>

- 用法及び用量を厳守してください。
- 小児に使用させる場合には, 保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- 粘着テープ等でかぶれやすい人は使用しないでください。
- 汗をかいたり, 患部がぬれているときは, よく拭き取ってから使用してください。
- 多量の汗をかくことが予想される場合は, 膏体がやわらかくなりすぎる可能性があるため, 使用を控えてください。

### [保管及び取扱い上の注意]

- 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- 開封後はファスナーを閉めて保管してください。
- 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

お問い合わせ先

大協薬品工業株式会社

お客様相談窓口

電話:076-479-1313

受付時間 9:00~17:00(土,日,祝日を除く)

副作用被害救済制度 電話:0120-149-931

8枚入 (11.9cm×7.7cm)