

2008年12月作成

使用に際して、この説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

筋肉痛、関節痛、打撲・捻挫に

プロナインドメタシengel1.0%

第2類医薬品 インドメタシン配合外用消炎鎮痛剤

プロナインドメタシengel1.0%の特徴

- (1) インドメタシンが患部に直接浸透して、痛みの原因物質の生成を抑えます。
- (2) *l*-メントールのさわやかな清涼感が患部の痛みを和らげます。
- (3) のびがよく、べつつかないゲルタイプの製剤です。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は使用しないでください

- (1) 本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (2) ぜんそくを起こしたことがある人。

2. 次の部位には使用しないでください

- (1) 目の周囲、粘膜等。
- (2) 湿疹、かぶれ、傷口。
- (3) みずむし・たむし等又は化膿している患部。

3. 長期連用しないでください



相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師にご相談ください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (4) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師にご相談ください

- (1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、はれ、かゆみ、かぶれ、ヒリヒリ感、熱感、乾燥感

- (2) 5～6日間使用しても症状がよくなる場合

(裏面もご覧ください。)

効能・効果

筋肉痛、肩こりに伴う肩の痛み、腰痛、関節痛、腱鞘炎（手、手首の痛み）、肘の痛み（テニス肘など）、打撲、捻挫

用法・用量

年 齢	使 用 方 法
11 歳 以 上	1 日 4 回を限度として適量を患部に塗擦してください。
11 歳 未 満	使用させないでください。

＜用法・用量に関連する注意＞

- (1) 定められた用法・用量を守ってください。
- (2) 11歳以上の小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 目に入らないように注意してください。万一目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (4) 本剤は外用にのみ使用し、内服しないでください。
- (5) 塗擦部位をラップフィルム等の通気性の悪いもので覆わないでください。
- (6) 1 週間あたり50 g を超えて使用しないでください。
- (7) 使用後は手を洗ってください。

成分・分量(100 g 中)

成 分 名	分 量	は た ら き
インドメタシン	1.0 g	痛みの原因物質の生成を抑えます。
ℓ-メントール	3.0 g	さわやかな清涼感で患部の痛みを和らげます。

添加物として、プロピレングリコール、ラウロマクロゴール、ベンジルアルコール、クロタミトン、エタノール、パラオキシ安息香酸メチル、エデト酸ナトリウム水和物、カルボキシビニルポリマー、ジソプロパノールアミンを含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光をさけ、涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3) 誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れかえないでください。
- (4) 火気に近づけないでください。
- (5) メガネ、時計、アクセサリー等の金属類、化繊の衣類、プラスチック類、床や家具などの塗装面等に付着すると変質することがありますので、付着しないように注意してください。
- (6) 使用期限（チューブ及びケースに表示）を過ぎた製品は使用しないでください。

お問い合わせ先

新新薬品工業株式会社 お客様相談室

TEL：076-435-0878

受付時間 9：00～17：00（土，日，祝日を除く）

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

製造販売元 **新新薬品工業株式会社**
富山県富山市今市324番地 〒930-2221