

この添付文書は、お薬とともに保管し、ご使用の際には、必ずお読み下さい。

【鎮痒消炎薬】

ホノザルベ®

- ◆ あせもやかゆみ、虫さされなどの皮膚病を改善するために考え出された塗り薬です。
- ◆ ホノザルベ中のアミノ安息香酸エチル・ｻｰﾒﾝﾄｰﾙはかゆみを抑え、ジフェンヒドラミンはかゆみの原因であるヒスタミンの働きを抑えて、アミノ安息香酸エチルなどの働きを助け、チンク油はかゆみによって起こる皮膚の炎症を鎮めます。

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談すること
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
 - (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (4) 湿潤やただれのひどい人。
2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること
 - (1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ
 - (2) 5～6日間使用しても症状がよくなる場合
3. 他の医薬品等を併用する場合には、含有成分の重複に注意する必要があるため、医師又は薬剤師に相談すること

効能・効果

あせも、かゆみ、虫さされ、やけど

用法・用量

1日2～3回、適当量を患部に塗布又は塗擦して下さい。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 用法・用量を厳守すること。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- (3) 目に入らないよう注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。
- (4) 外用にのみ使用すること。
- (5) 患部を清潔にしてから使用すること。

成分・分量

本剤100g中

アミノ安息香酸エチル	0.78g	チンク油	40.79g
ジフェンヒドラミン	1.00g	バレイシヨデンブﾝ	27.50g
フェノール	1.96g	ｻｰﾒﾝﾄｰﾙ	0.47g
ボレイ末	27.50g		

・本剤は白色で、長く静置するとき、成分の一部を分離する泥状物です。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)

使用ポイント

- ・ 軟膏の表面に黄色～褐色の油が浮いているときは、添付の棒で均一になるまでかき混ぜてからご使用下さい。効果に変わりはありませんが、塗りやすくなります。
- ・ 以下に使用例を示しますが、ホノザルベのより詳しい使い方については、ホノミ漢方会々員の薬局・薬店の先生方にご相談下さい。
- ・ 使用例

あせも (汗疹)	汗が皮膚に残っていると治りにくいので、軟膏を塗る前に患部を洗って清潔にして下さい。その後ホノザルベをすり込むようにして下さい。ホノザルベはすり込んでいる内にベトツキがなくなり、サラツとしてきます。
かゆい症状 (掻痒症)	かぶれ、じんましん、アレルギー、その他皮膚がかゆい時にホノザルベを塗って下さい。すり込むほうが良いですが、すり込む時に痛むようであれば軽く塗るだけでも結構です。
やけど	軽いやけど(発赤する程度)には、ホノザルベを軽く塗布し、すり込まないようにしてガーゼ等で保護して下さい。水疱(みずぶくれ)のできている時、ただれている時には使わないようにして下さい。また、やけど以外でも「ただれ」のひどい所には使用しないようにして下さい。

お問い合わせ先

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、又は下記にお願いします。

剂盛堂薬品株式会社 学術部

電話 073(472)3111(代表)

受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元



剂盛堂薬品株式会社

〒640-8323 和歌山市太田515番地1