

ムヒ® S

販売名：ムヒS

この製品の特長

- かゆみや炎症を抑える成分がよく皮ふに浸みこみ、すぐれた効き目をあらわします。
- サラッとした、使用感の良いクリームです。
- スーッとする心地よい清涼感が持続します。
- ステロイド成分は配合されていません。



使用上の注意

相談すること



1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (3) 薬や化粧品等によりアレルギー症状(発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある人。
- (4) 湿潤やただれのひどい人。

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この説明文書をもって医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 使用后、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ

- (2) 5～6日間使用しても症状がよくなる場合。

効 能

かゆみ、虫さされ、かぶれ、しっしん、じんましん、あせも、しもやけ、皮ふ炎、ただれ

用法・用量


1日数回、適量を患部に塗布してください。

<用法・用量に関連する注意>

- (1) 定められた用法・用量を守ってください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。なお、本剤の使用開始目安年齢は生後3カ月以上です。
- (3) 目に入らないように注意してください。万一目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合(充血や痛みが持続したり、涙が止まらない場合等)には、眼科医の診療を受けてください。
- (4) 本剤は外用にのみ使用し、内服しないでください。

《チューブの使い方》

本チューブの出し口は薄い金属の膜で閉じられています。キャップを逆さにして、キャップ上部の突起部をチューブの先に強く押し当て、金属の膜に穴を開けてから使用してください。(使用後はキャップをしっかりしめてください。)



成分とそのはたらき

有効成分（100 g 中）

成 分	分 量	は た ら き
ジフェンヒドラミン	1.0 g	かゆみをおさえます。
グリチルレチン酸	0.3 g	生薬カンゾウ由来の成分で、炎症をおさえます。
ℓ-メントール	5.0 g	清涼感を与え、かゆみをしずめます。
dℓ-カンフル	1.0 g	清涼感を与え、かゆみをしずめます。
イソプロピルメチルフェノール	0.1 g	殺菌作用があります。

添加物としてポリソルベート60、エデト酸Na、カルボキシビニルポリマー、ジイソプロパノールアミン、パラベン、オクチルドデカノール、1,3-ブチレングリコール、ステアリルアルコールを含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (2)高温をさけ、直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (3)他の容器に入れかえないでください。（誤用の原因になったり品質が変わります。）
- (4)使用期限（ケース及びチューブに西暦年と月を記載）をすぎた製品は使用しないでください。
使用期限内であっても、品質保持の点から開封後はなるべく早く使用してください。

虫さされのお手当てのポイント

- 虫さされの薬を早く塗布してください。早いほど効果的です。
- 患部をかきむしらないようにしてください。かきむしると症状が悪化して、あとが残る場合があります。特に小児では化膿することがあります。
- 症状が強い場合は、更に氷水などで冷やすと早く炎症をしずめます。
- ドクガ、イラガなどは肌に微細な刺毛が残ることがあります。粘着テープなどを貼り、刺毛を取り除いてから虫さされの薬を塗布してください。
- ハチに刺された場合は激しい灼熱痛を伴います。息苦しさ、全身倦怠、吐き気などの気配が見られた場合は、救急車などを呼び一刻も早く医師の手当てを受けてください。

お子さまが誤ってムヒSを口にした場合

- ①まず、口の中の物をふき取ってあげてください。
- ②少しなめた程度では影響はありません。ただし、たくさん口にすると眠気があらわれることがあります。
- ③1時間ほど様子を見て、呼吸などに異常がある場合は、医師に診てもらってください。

お客様相談窓口：株式会社 池田模範堂 〒930-0394 富山県中新川郡上市町神田16番地
☎ 076-472-0911〔電話受付時間：月～金（祝日を除く）9：00～17：00〕