



かゆみ肌TMの治療薬 ムヒソフト[®]GX 乳状液

鎮痒消炎剤

販売名：ムヒソフトGX乳状液


かゆみ・皮膚炎に効く、「かゆみ肌」の治療薬です！

●かゆくなりやすい「かゆみ肌」

肌が乾燥するとたちまちかゆくなる、かゆみ止めを塗るとかゆみは止まるが、翌日にはまたかゆくなる、乾燥している間は薬が手放せない…。そんなかゆくなりやすい肌が「かゆみ肌」。寒さや加齢で元気を失った肌細胞はうるおい補給力が低下してしまいます。その結果、かゆみの元となる刺激からお肌を守るバリアが不足してしまう…。これが「かゆみ肌」を引き起こす原因です。

●そこで「かゆみ肌」の治療薬・ムヒソフトGX乳状液

ムヒソフトGX乳状液は「かゆみ止め成分」に「かゆみ肌を元気にするビタミン」をプラス配合。かゆみを止めるだけでなく、肌細胞を元気にして、かゆくなりやすい「かゆみ肌」を治療します。



〔模式図〕



使用上の注意

相談すること



- 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
 - (3) 薬や化粧品等によりアレルギー症状(発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある人。
 - (4) 湿潤やただれのひどい人。
- 次の場合は、直ちに使用を中止し、この説明文書をもって医師又は薬剤師に相談してください
 - (1) 使用后、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ

- (2) 5～6日間使用しても症状がよくなる場合。

効 能

かゆみ、皮膚炎、かぶれ、しっしん、じんましん、あせも、しもやけ、虫さされ、ただれ

用法・用量

1日数回、適量を患部に塗布してください。

・よく振って使用してください。

<用法・用量に関連する注意>

- (1)定められた用法・用量を守ってください。
- (2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。なお、本剤の使用開始目安年齢は生後1カ月以上です。
- (3)目に入らないように注意してください。万一目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合(充血や痛みが持続したり、涙が止まらない場合等)には、眼科医の診療を受けてください。
- (4)本剤は外用にのみ使用し、内服しないでください。

成分とそのはたらき

有効成分 (100g中)

成 分	分 量	は た ら き
ジフェンヒドラミン塩酸塩	2.0g	かゆみを止めます。
パンテノール(プロビタミンB ₅)	1.0g	お肌の正常なはたらきを助けます。
トコフェロール酢酸エステル	0.5g	血行をよくし、症状の回復を早めます。
グリチルレチン酸	0.2g	生薬カンゾウ由来の成分で、炎症をおさえます。

添加物としてステアリン酸マクロゴール、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、ステアリン酸ソルビタン、水添大豆リン脂質(水素添加レシチン)、エデト酸Na、ニコチン酸アミド、ジイソプロパノールアミン、カルボキシビニルポリマー、グリセリン、1,3-ブチレングリコール、セタノール、トリイソオクタン酸グリセリン、乳酸Na(フルーツ酸)を含有します。

保湿性基剤成分としてグリセリン、水素添加レシチン、フルーツ酸を配合しています。

本剤にステロイド成分は配合されていません。

保管及び取扱い上の注意

- (1)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (2)高温をさけ、直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (3)他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)使用期限(ケース底面及び容器底面に西暦年と月を記載)をすぎた製品は使用しないでください。使用期限内であっても、品質保持の点から開封後はなるべく早く使用してください。
- (5)液もれを防ぐためキャップをしっかりと閉めてください。

このような症状にお使いください

- お風呂上がりなど、からだが温まったときのかゆみに。
- お休み前、就寝中のがまんできないかゆみに。
- 衣服のすれや、下着の締めつけによるかゆみに。
- 背中、手足などの広い範囲のかゆみに。
- お子さまのアトピー性皮膚炎などに伴うかゆみにも。

お風呂では、大切なお肌のうるおい成分を失いがちです。お風呂上がりには**ムヒソフトGX乳状液**でうるおいを保ち、お肌を保護することがお手当てのポイントです。

敏感な部分(顔面、首、陰部など)や乳幼児に使用する場合は、あらかじめお肌の目立たない部分に少量塗布し、翌日様子を見てから使用してください。

お子さまや高齢の方が誤ってムヒソフトGX乳状液を口にした場合

- ①少しなめた程度では影響はありません。ただし、たくさん口にとると眠気があらわれることがあります。
- ②次の場合には、なるべく早く医師に診てもらってください。
 - ・大量(おおよそ大人で20mL以上)飲み込んだとき
 - ・めまい、はきけ、倦怠感(だるさ)、呼吸異常などがあるとき

お客様相談窓口：株式会社 池田模範堂 〒930-0394 富山県中新川郡上市町神田16番地
☎ 076-472-0911 (電話受付時間：月～金(祝日を除く) 9:00～17:00)

製造販売元



株式会社 池田模範堂
富山県中新川郡上市町神田16番地

®登録商標

SS04

「かゆみ肌」は池田模範堂の商標です。