

ムヒパッチA

鎮痒消炎剤



使用上の注意

してはいけないこと



(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

次の部位には使用しないでください

傷口、湿潤、かきこわし、ただれ、かぶれ、目の周囲、粘膜、顔

相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。(2) 本人又は家族がアレルギー体質の人。(3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、このケースをもって医師又は薬剤師に相談してください
(1) 使用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ

- (2) 5～6日間使用しても症状がよくなる場合。

効 能 虫さされ、かゆみ、しもやけ

用法・用量 パッチを台紙からはがし、1日数回患部に貼付してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

(1) 1回の使用は4～5時間を目安とし、同じ場所に長時間の使用はさけてください。まれに貼付部位にかぶれや色素沈着などを起こすことがあります。(2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。なお、本剤の使用開始目安年齢は1才以上です。(3) 汗をかいたり、皮ふがぬれている時は、よくふき取ってから使用してください。

有効成分 1.25m² (膏体100g) 中

ジフェンヒドラミン(かゆみ止め成分)……………1.0g

イソプロピルメチルフェノール(殺菌剤)……………1.0g

ℓ-メントール(清涼感剤)……………3.0g

添加物としてエステルガム、脂環族飽和炭化水素樹脂、脂肪族炭化水素樹脂、スチレン・イソブレン・スチレンブロック共重合体、テルペン樹脂、生ゴム、ポリブテンを含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 小児の手のとどかない所に保管してください。(2) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。(3) 他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)(4) 保管の際にはアルミ袋を折り線で折りまげて保管してください。(5) 使用期限(ケースに西暦年と月を記載)をすぎた製品は使用しないでください。

包 装 76枚入(直径2.8cm)

Ⓔ登録商標

本剤にステロイド成分は配合されていません

お客様相談窓口 ☎ 076-472-0911

〔月～金(祝・祭日を除く)8:30～17:30〕

発売元



株式会社 池田模範堂

富山県中新川郡上市町神田16番地

製造販売元

株式会社 大石膏盛堂

佐賀県鳥栖市本町1丁目933番地

