

メンフラAはビタミンEと温感成分(ノニル酸ワニリルアミド)による血行促進作用や、サリチル酸メチルなどによる消炎・鎮痛作用で、肩のこり・腰の痛みをやわらげる貼り薬です。

[成分] 1m²中(膏体144.81g当たり) トコフェロール酢酸エステル(ビタミンE)0.5g、ノニル酸ワニリルアミド0.01g、サリチル酸メチル9.0g、l-メントール4.5g、dl-カンフル1.8g、ハッカ油1.2g

添加物:ゴムラテックス、アクリル酸メチル・アクリル酸-2-エチルヘキシルコポリマー、ポリオキシエチレンノニルフェニルエーテル、ポリブテン、生ゴム、ポリイソブチレン、炭酸Ca、エステルガム、テルペン樹脂、酸化チタン、赤色405号、香料

鎮痛消炎薬



使用上の注意

☒ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は使用しないでください

天然ゴムによるアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 次の部位には使用しないでください

(1)目の周囲、粘膜等。(2)湿疹、かぶれ、傷口。

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、痛み

3. 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【効能】肩こり、腰痛、筋肉痛、筋肉疲労、関節痛、打撲、捻挫、しもやけ

【用法・用量】ライナー(プラスチックフィルム)をはがし、患部に1日1~2回貼ってください。

〈注意〉

(1)用法を厳守してください。

(2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。

(3)汗をかいたり、患部がぬれている時は、よくふき取ってから使用してください。

(4)貼った患部をコタツや電気毛布等で温めないでください。

(5)皮膚のとくに弱い人は、同じ部位に続けて貼ることをさせてください。

(6)皮膚が弱くかぶれやすい人は、使用前に小片を腕の内側に半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみなどの症状が起きないことを確かめてから使用してください。

(7)本剤の使用により、とくに強いかゆみや痛みがでた場合には使用を中止してください。

(8)本剤を貼ったまま、あるいははがした直後に入浴しないでください。(強い刺激を感じることがありますので、少なくとも入浴の1時間前にははがし、入浴後は30分程してから使用してください)

お客様 119 番室

電話 03-3985-1800

※受付時間は、大正製薬ホームページにてご確認ください

大正製薬株式会社

発売元 東京都豊島区高田3丁目24番1号

<https://www.taisho.co.jp/>

製造 大協薬品工業株式会社

販売元 富山市水橋富等173

肩のこり・腰の痛みに

メンフラA 第3類医薬品

血行促進プラスター

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)
- (4)未使用分は、袋に入れて開封口を折り曲げて保管してください。
- (5)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後は品質保持の点からなるべく早く使用してください。