

外用消炎・鎮痛剤 第3類医薬品

ラク-ルタツテ **スティックタイプ**



伸びがよく、手軽に塗れる！
スティックタイプ

下部の回転部を右へ回し
薬剤を3~4mm出して
使用してください。



肩こり



腰痛



関節痛などに

※揮発性が強いので、ご使用後は必ず
キャップをしめて保管してください。

副作用被害救済制度
電話 0120-149-931



製造番号

使用期限

外用消炎・鎮痛剤 **税控除対象**

ラク-ルタツテ **スティックタイプ**

肩こり・筋肉痛
関節痛・腰痛に

清涼成分 ℓ -メントール配合

痛みに!

伸びがよく、
手軽に塗れる！
スティックタイプ

第3類医薬品



【用法・用量】

通常1日1~数回適量を患部に塗擦してください。キャップをとり回転部を右回転させ薬剤を3~4mm出して使用してください
〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) 目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (3) 外用にのみ使用してください。
- (4) 定められた用法・用量をお守りください。

【成分・分量】 100g中

サリチル酸メチル.....15g
 ℓ -メントール.....5g
d ℓ -カンフル.....5g
ハッカ油.....1g

添加物：ステアリン酸Na、ソルビタンセスキオレイン酸エステル、イソプロパノール、1,3-ブチレングリコール、ミリスチン酸イソプロピル

【保管及び取扱い上の注意】

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください
- 小児の手の届かない所に保管してください
- 揮発性が強いので、使用後は必ず密栓してください
- 火気に近づけないでください
- 他の容器に入れかえないでください(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)
- 使用期限(外箱及び容器に記載)を過ぎた製品は使用しないでください

発売元

東光クリエート株式会社
東京都足立区鹿浜1丁目9番14号

製造販売元

東光薬品工業株式会社
東京都足立区新田2丁目16番23号

お問い合わせ先 TEL 03-3855-0101

こちら
開けてください

第3類
医薬品



外用消炎・鎮痛剤 **ラク-ルタツテ**

【効能・効果】 下記における消炎・鎮痛
腰痛、打撲、捻挫、肩こり、筋肉痛、関節痛、
筋肉疲労、しもやけ

ご使用に際し、この説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう
大切に保管してください。

△ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用
が起りやすくなります)

- 次の部位には使用しないでください
(1)目の周囲、粘膜等。
- 湿疹、かぶれ、傷口。

⊗ 相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

- 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください