

(きりとり線)



開封後は、袋の口を折り曲げて保管してください

第3類医薬品

ビタミンE酢酸エステル配合

外 用 薬

【保管及び取扱い上の注意】

1. 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
2. 小児の手の届かない所に保管してください。
3. 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
4. 開封後は、袋の口を折り曲げて保管してください。
5. 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

ソドエール7枚入

微香性 **ソドエール7** 枚入 (14cm×10cm)

外用消炎鎮痛薬

第3類医薬品

【特 長】

- 打撲、ねんざなどの急性炎症で、熱感があるときも、水分を含む基剤の湿布効果で適度な冷感が保たれ、有効成分の働きを助けます。
- 伸びのよい特殊な不織布を使用していますので、ひじやひざなどの関節部分の動きにもピッタリフィットします。
- ビタミンE 酢酸エステルが末梢血管の動きをよくし、血液の流れをスムーズにして、患部の消炎作用を助長します。



使用上の注意

☒ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)
次の部位には使用しないでください
(1) 目の周囲、粘膜等。 (2) 湿疹、かぶれ、傷口。

相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください
(1) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
(2) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師又は薬剤師に相談してください
(1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

- (2) 5～6日間使用しても症状がよくなる場合

【効能又は効果】

ねんざ、打撲、筋肉痛、骨折痛、関節痛、肩こり、腰痛、筋肉疲労、しもやけ。

【使用法】

表面のフィルムをはがし、1日1～2回直接患部に貼ってください。必要に応じて包帯などで固定してください。

<使用法に関連する注意>

1. 定められた使用法を守ってください。
2. 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
3. 患部の広さ、状態に応じて、フィルムの上から適当な大きさに切ってお使いください。

【有効成分】 膏体100g(1167cm²)中の成分

サリチル酸グリコール 1.0g
l-メントール 0.8g
トコフェロール酢酸エステル 0.3g

添加物として、ラウロマクロゴール、濃グリセリン、カルメロースナトリウム、タルク、pH調整剤、乾燥水酸化アルミニウムゲル、ポリアクリル酸部分中和物、ポリアクリル酸液、その他2成分を含有する。

製造販売元 **ソドケミカル株式会社** 富山市日俣77-3



お客様相談窓口 電話 076-425-1978
(土・日・祝日を除く 9:00～17:00)

副作用被害救済制度の問合せ先
(独) 医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)