

使用前にこの説明書を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

ぢけくわ

販売名

ロイヒつば膏

第3類医薬品

品番 RT156

## 【使用上の注意】

❌【してはいけないこと】(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の部位には使用しないでください。

①目の周囲、粘膜等。②湿疹、かぶれ、キズぐち。

## 【相談すること】

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

①本人又は家族がアレルギー体質の人。

②薬によりアレルギー症状(例えば発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

| 関係部位 | 症 状          |
|------|--------------|
| 皮 膚  | 発疹・発赤、かゆみ、痛み |

3. 5～6日間使用しても症状の改善が見られない場合は、使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

## 【その他の注意】

入浴する時は、貼った場所がヒリヒリする場合がありますので、必ず30分～1時間位前には、はがしてください。貼ったままの入浴はしないでください。

〈効能・効果〉肩のこり、腰の痛み、打撲、捻挫、関節痛、筋肉痛、筋肉疲労、しもやけ、骨折痛

〈用法・用量〉ロイヒつば膏®の膏面をフィルムからはがし、患部にお貼りください。

〈用法・用量に関連する注意〉

①小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。

②皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側に1cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が発現しないことを確かめてから使用してください。

③汗などをよく拭きとり、患部をきれいにしてからお貼りください。

④皮膚の弱い人は、同じところには続けて貼らないでください。

⑤体質によってはかぶれ等が生じることがありますので、入浴直後の貼付はさけてください。

⑥本品は外用にのみ使用し、内服しないでください。

⑦発熱するもの(コタツ、ホットカーペット、カイロ、電気毛布等)と併用しますと、刺激が強くなる場合がありますので、ご注意ください。

〈包 装〉直径2.8cm・・・156枚 チャック付き袋

本品についてのお問い合わせは、お買い求めの販売店、又は下記にお願いいたします。

ニチバン株式会社 お客様相談室 ☎0120-377218

受付時間：9：00～12：00、13：00～17：00(土日、祝日を除く)

副作用被害救済制度のお問い合わせ先：

(独)医薬品医療機器総合機構 ☎0120-149931

<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>

ニチバン株式会社

〒112-8663

東京都文京区関口2-3-3

<http://www.nichiban.co.jp/>

日本製 MADE IN JAPAN

®は登録商標です。NB14M06

ロイヒつば膏®はノニル酸ワニルアミドの温感刺激により患部の血行を促進し、サリチル酸メチル、*l*-メントールなどの鎮痛消炎作用とあわせ、すぐれた効果をあらわします。

〈保管及び取扱い上の注意〉


①小児の手のとどかない所に保管してください。

②直射日光をさけ、なるべく湿気の少ない涼しい所に保管してください。

③誤用をさけ、品質を保持するため、開封後は元の袋で、チャックをしつかりしめて保管してください。

④保管の際は、できるだけ中の製品を押さえつけないようにしてください。

【貼り方の参考例】下図を参考に、指で押してみても痛みを感じるところ、こりがあるところを中心に貼ってください。



例1 肩こり

例2 肩こり

例3 肩こり・腰痛

例4 腰痛

〈成分・分量〉

膏体100g中 サリチル酸メチル……………7.17g  
*l*-メントール……………3.25g  
ハッカ油……………0.35g  
*d l*-カンフル……………2.51g  
チモール……………0.05g  
ノニル酸ワニルアミド……………0.03g

添加物として、生ゴム、ポリイソブチレン、ポリブテン、石油系樹脂、BHT、重質炭酸カルシウム、カーボンブラック、三二酸化鉄、赤色227号、その他1成分を含有する。



製造番号

使用期限



個箱



製品袋

使用前にこの説明書を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

ぎけくわ

販売名

ロイヒつば膏

第3類医薬品

品番 RT78

## 【使用上の注意】

❌【してはいけないこと】(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の部位には使用しないでください。

①目の周囲、粘膜等。②湿疹、かぶれ、キズぐち。

## 【相談すること】

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

①本人又は家族がアレルギー体質の人。

②薬によりアレルギー症状(例えば発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

| 関係部位 | 症 状          |
|------|--------------|
| 皮 膚  | 発疹・発赤、かゆみ、痛み |

3. 5～6日間使用しても症状の改善が見られない場合は、使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

## 【その他の注意】

入浴する時は、貼った場所がヒリヒリする場合がありますので、必ず30分～1時間位前には、はがしてください。貼ったままの入浴はしないでください。

＜効能・効果＞肩のこり、腰の痛み、打撲、捻挫、関節痛、筋肉痛、筋肉疲労、しもやけ、骨折痛

＜用法・用量＞ロイヒつば膏®の膏面をフィルムからはがし、患部にお貼りください。

＜用法・用量に関連する注意＞

①小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。

②皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側に1cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が発現しないことを確かめてから使用してください。

③汗などをよく拭きとり、患部をきれいにしてからお貼りください。

④皮膚の弱い人は、同じところには続けて貼らないでください。

⑤体質によってはかぶれ等が生じることがありますので、入浴直後の貼付はさけてください。

⑥本品は外用にのみ使用し、内服しないでください。

⑦発熱するもの(コタツ、ホットカーペット、カイロ、電気毛布等)と併用しますと、刺激が強くなる場合がありますので、ご注意ください。

＜包 装＞直径3.9cm・・・78枚 チャック付き袋

本品についてのお問い合わせは、お買い求めの販売店、又は下記にお願いいたします。

ニチバン株式会社 お客様相談室 ☎0120-377218

受付時間：9:00～12:00、13:00～17:00(土日、祝日を除く)

副作用被害救済制度のお問い合わせ先：

(独)医薬品医療機器総合機構 ☎0120-149931

<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>

ニチバン株式会社

〒112-8663

東京都文京区関口2-3-3

<http://www.nichiban.co.jp/>

日本製 MADE IN JAPAN

®は登録商標です。NB14M05

ロイヒつば膏®はノニル酸ワニルアミドの温感刺激により患部の血行を促進し、サリチル酸メチル、ℓ-メントールなどの鎮痛消炎作用とあわせ、すぐれた効果をあらわします。

＜保管及び取扱い上の注意＞

①小児の手のとどかない所に保管してください。

②直射日光をさけ、なるべく湿気の少ない涼しい所に保管してください。

③誤用をさけ、品質を保持するため、開封後は元の袋で、チャックをしかりしめて保管してください。

④保管の際は、できるだけ中の製品を押さえつけないようにしてください。

【貼り方の参考例】下図を参考に、指で押してみても痛みを感じる場所、こりがあるところを中心に貼ってください。



＜成分・分量＞

膏体100g中 サリチル酸メチル……………7.17g  
ℓ-メントール……………3.25g  
ハッカ油……………0.35g  
dℓ-カンフル……………2.51g  
チモール……………0.05g  
ノニル酸ワニルアミド………0.03g

添加物として、生ゴム、ポリイソブチレン、ポリブテン、石油系樹脂、BHT、重質炭酸カルシウム、カーボンブラック、三二酸化鉄、赤色227号、その他1成分を含有する。



個箱



製品袋

製造番号

使用期限