

ラフェルサ®

180枚

肩こり・腰痛に

ATATAMARU-KO

こり・鎮痛温感貼付剤

温丸膏

【実物大】



肩こりや腰痛部分にピンポイントで貼れる温感タイプの消炎鎮痛貼り薬です。

温感刺激のあるノニル酸ワニルアミドと血液の循環を良くするビタミンE(トコフェロール酢酸エステル)のダブル効果で患部の血行を促進します。

サリチル酸グリコールとL-メントールの消炎鎮痛効果で患部の痛みをやわらげます。

スリットが入っているのでムレやかぶれにくく、優しく肌にぴったりフィット。

第3類医薬品



ご使用後はチャックを押さえて閉めてください。

切り取り線



鎮痛消炎薬 温丸膏

第3類医薬品

△ 使用上の注意

してはいけないこと ☒

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は使用しないでください 天然ゴムによるアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 次の部位には使用しないでください (1)目の周囲、粘膜等。(2)湿疹、かぶれ、傷口。
3. 本剤の使用による強い刺激を避けるための事項 本剤をはってから汗をかくと強い刺激を感じるため、汗をかきそうな作業やスポーツを行う前にははらないでください。

相談すること ☒

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください (1)本人又は家族がアレルギー体質の人。(2)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師又は薬剤師に相談してください

(1)使用後、次の症状があらわれた場合	関係部位	症 状
	皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、痛み

(2)5～6日間使用しても症状がよくなる場合

【効能・効果】

肩こり、腰痛、関節痛、筋肉痛、捻挫、打撲、筋肉疲労、しもやけ、骨折痛

【用法・用量】

1日1～2回ライナーをはがし、患部にはってください。

【用法・用量に関連する注意】

- (1)定められた用法・用量を守ってください。
- (2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3)はった患部をコタツや電気毛布等で温めないでください。
- (4)はったままあるいははがした直後に入浴すると強い刺激を感じるため、1時間以上前にはがして入浴してください。また、入浴後は30分位してから使用してください。
- (5)患部が汗等でぬれている時は、よく拭き取ってから使用してください。
- (6)皮膚の弱い方は、使用前に腕の内側に小片をはり、発疹・発赤、かゆみ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。
- (7)本剤の使用により、とくに強いかゆみや痛みが出た場合には、使用を中止してください。

【成 分】1.0㎡中

ノニル酸ワニルアミド……………0.04g トコフェロール酢酸エステル……………0.5g
サリチル酸グリコール……………8.0g β -メントール……………4.5g
添加物：ポリブテン、生ゴム、ポリイソブチレン、エステルガム、テルペン樹脂、炭酸Ca、酸化チタン、アクリル酸メチル・アクリル酸-2-エチルヘキシル共重合樹脂、ポリオキシエチレンノニルフェニルエーテル、ゴムラテックス、赤色405号

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)なお、品質を保持するため、開封後は未使用分をアルミ袋に入れチェックを閉めて保管してください。
- (4)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

副作用被害救済制度のお問い合わせ先
フリーダイヤル ☎ 0120-149-931



アルミ袋：PE、金属

するときは、お住まいの市町村の定める区分に従ってください。

お問い合わせ先

大協薬品工業株式会社

お客様相談窓口 電話 076-479-1313

受付時間 9：00～17：00(土、日、祝日を除く)

発売元 新 生 薬 品 株 式 会 社

富山県中新川郡上市町森元町7-2

製造販売元 大協薬品工業株式会社

富山県水橋町等173

TO1

製造番号

使用期限

ご使用後はチェックを押さえて閉めてください。