

ご使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

かゆみ・虫さされに (販売名) 近江兄弟社メンタームペンソールS 鎮痒消炎薬

【特長】●しつこいかゆみ、はれ・赤みのもととなる炎症をおさえます。●本剤は、アルコール等を基剤とする透明の液体で、患部に軽く塗布するだけで爽快感を与え、皮ふへのなじみもよく、速やかに乾燥し、べつつかず衣服をよごしません。●本剤は、着色剤、界面活性剤を含んでおりません。

⚠【使用上の注意】

❌ **してはいけないこと** (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用がおこりやすくなります。)

1. 次の部位には使用しないでください。
(1) 水痘(水ぼうそう)、水虫、たむし等又は化膿している患部。(2) 創傷面、目の周囲、粘膜等。
2. 長期連用しないでください。 3. 本剤はステロイド剤(副腎皮質ホルモン剤)デキサメタゾン酢酸エステルを含んでおり、顔面に広範囲又は長期間(2週間以上)塗布すると赤ら顔のようになることがありますので、顔面に続けて長く使用しないでください。



相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください。
(1) 医師の治療を受けている人。(2) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
(3) 薬や化粧品等によりアレルギー症状(例えば発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある人。(4) 患部が広範囲の人。(5) 湿潤やかぶれのひどい人。
2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。
(1) 使用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症 状
皮ふ	発疹・発赤、はれ、かゆみ
皮ふ(患部)	水虫・たむし等の白せん症、にきび、化膿症状、持続的な刺激感、発疹

- (2) 5～6日間使用しても症状の改善が見られない場合。

【効能・効果】 かゆみ、虫さされ、皮膚炎、湿疹、かぶれ、ただれ、じんましん、あせも、しもやけ。

【用法・用量】 1日数回、患部に適量塗布してください。

＜用法・用量に関連する注意＞

- (1) キャップをとりはずし、スポンジ部分を肌に1～2回軽く押し当てて、スポンジに薬液をしみ込ませてからご使用ください。
- (2) 定められた用法・用量を守ってください。
- (3) 目に入らないよう注意してください。万一目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (4) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (5) 本剤は外用にのみ使用してください。

【成分・分量】 100mL中に次の成分を含みます。

成 分	分 量	働 き
デキサメタゾン酢酸エステル	0.025g	ぶりかえすかゆみやはれ・赤み等のもとになる炎症をおさえます。
ジフェンヒドラミン塩酸塩	1.0g	虫さされ等に伴うかゆみをおさえます。
l-メントール	3.5g	清涼感を与え、かゆみをしずめます。
dl-カンフル	1.0g	清涼感を与え、かゆみをしずめます。
イソプロピルメチルフェノール	0.1g	殺菌作用があります。

添加物としてエタノール、1,3-ブチレングリコール、ジブチルヒドロキシトルエンを含有する。

【ペンソールSに配合されているステロイド成分について】

ステロイド成分は、虫さされ等によるアレルギー性の炎症をおさえ、主にかゆみの長期化と悪化の回避に有効にはたします。特にぶりかえすしつこいかゆみには、ステロイド成分が適しています。ステロイド成分による副作用は、長期間継続使用した場合、皮ふが薄い顔や首等にあられやすく、顔の場合は赤ら顔になることがあります。ペンソールSに配合されているデキサメタゾン酢酸エステルは、作用緩和なステロイド成分ですので、虫さされ等小さな患部に短期間使用する場合には副作用はほとんどありません。症状の改善とともに徐々に減量・中止するようにしてください。同じ部位に継続して使う場合は、顔には2週間以内、その他の部位は4週間以内を目安にしてください。早めに使って早めに治すことが、ステロイド成分配合剤の上手な使い方です。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 使用後は必ずキャップを十分にしめてください。
- (2) 高温・直射日光をさけ、涼しい所に密栓して保管してください。
- (3) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (4) 他の容器に入れかえないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (5) 火気に近づけないでください。
- (6) メガネ、時計、アクセサリ、プラスチック類、化繊製品、皮革製品、床や家具などの塗装面等に付着すると変質することがありますので、付着しないように注意してください。
- (7) 本剤のついた手で目等の粘膜にふれないでください。

お問い合わせ先
株式会社 近江兄弟社 お客様相談室
TEL.0748-32-3135

受付時間：午前8:30から午後5:30まで(土、日、祝日を除く)

製造販売元 株式会社 近江兄弟社 滋賀県近江八幡市魚屋町元29

【包装】60mL

第2類医薬品