

ご使用に際して、この箱の説明文を必ずお読みください。また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

▲ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)
次の部位には使用しないこと (1)目の周囲、粘膜等。(2)湿疹、かぶれ、傷口。



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談すること
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、痛み、皮膚のあれ

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って、医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

【保管及び取扱い上の注意】

(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わります)(4)期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、期限内であっても、開封後は品質保持の点からなるべく早くご使用ください。

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

お問い合わせ先 株式会社富山常備薬グループ

☎ 0120-137-093

受付時間：9時～18時(年中無休)

販売元

株式会社富山常備薬グループ
富山県富山市丸の内1丁目8番17号

製造販売元

株式会社雪の元本店
奈良県橿原市大谷町182番地



1903-AH



新サリトロンS

第3類医薬品

温感

ひざ・腰・肩などの

腰痛・肩こり

関節痛



富山常備薬グループ

第3類医薬品

鎮痛消炎剤

新サリトロンS

温感 50g

販売名:新サリトロンS 第3類医薬品

【用法・用量】

1日2～3回適量を患部に塗布する。

【用法・用量に関連する注意】

(1)定められた用法・用量を守ってください。(2)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には眼科医の診療を受けてください。(3)小児に使用させる場合は、保護者の指導監督のもとに使用させてください。(4)外用にのみ使用し、内服しないでください。(5)入浴前の使用は避けてください。

【効能・効果】

腰痛、肩こり、捻挫、筋肉痛、打撲、骨折痛、関節痛、筋肉疲労、しもやけ

【成分・分量】(100g中)

l-メントール 5.0g d-l-カンフル 3.0g

トコフェロール酢酸エステル 0.5g サリチル酸メチル 6.0g

ジフェニヒドラミン 0.5g トウガラシエキース 0.1g (厚生薬5gに相当)

※添加物として、流動パラフィン、プロピレングリコール、セタノール、サリシミツコウ、ポリオキシエチレンセチルエーテル、モノステアリン酸グリセリン、SEステアリン酸グリセリン、パラフィン、ステアリン酸ポリオキシル、ジメチルポリシロキサン、ユーガリ油、キサンタンガム、パラベンを含有する。

製造番号 使用期限