

ご使用に際してこの説明文書を必ずお読み下さい。また、必要なときに読めるよう大切に保管して下さい。

外用消炎鎮痛液剤

トクホンチール 第3類医薬品

△使用上の注意

【してはいけないこと】

☒（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる）

1. 次の部位には使用しないこと

- 1) 目の周囲、粘膜等
- 2) 湿疹、かぶれ、傷口

【相談すること】

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談すること

- 1) 本人又は家族がアレルギー体質の人
- 2) 薬によりアレルギー症状をおこしたことがある人

2. 次の場合は直ちに使用を中止し、この説明文書をもって医師又は薬剤師に相談すること

- 1) 使用後、皮ふに発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、はれ、痛み等の症状があらわれた場合
- 2) 5～6日間使用しても症状の改善が認められない場合

【用法及び用量】

適量を1日数回患部に塗布して下さい。

①小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させ、13歳未満の人には使用しないで下さい。②目に入らないよう注意して下さい。万一、目に入った場合には、すぐ水又はぬるま湯でよく洗い、症状が重い場合には眼科医の診療を受けて下さい。③外用にのみ使用し、内服しないで下さい。④入浴の1時間前には使用しないで下さい。使用直後に入浴すると強い刺激を感じることがあります。⑤皮ふの弱い人は、同じ所に続けて使用しないで下さい。⑥使用前に腕等に少量を塗布し、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、はれ、痛み等の症状があらわれないことを確かめてから使用して下さい。⑦塗布した所はよく乾かして下さい。乾かないうちに衣類等が触れると、変色することがありますので注意して下さい。⑧強い刺激を感じた場合には、よく泡立てた石鹸でやさしく患部を洗い流し、その後よく冷やして下さい。

刺激 じっくり タイプ

TOKUHON

肩こり

100mL



第3類医薬品

外用消炎鎮痛液剤

新

トクホンチール

筋肉痛

外用消炎鎮痛液剤

トクホンチール 第3類医薬品

【効能又は効果】

腰痛、打撲、捻挫、肩こり、関節痛、筋肉痛、筋肉疲労、しもやけ、骨折痛

【成分及び分量】

有効成分 100mL中

ℳ-メントール……………6.0g
サリチル酸グリコール……………3.0g
ビタミンE酢酸エステル……………0.5g
マレイン酸クロルフェニラミン……………0.1g
ノニル酸ワニリルアミド……………12mg
添加物としてアルコール、ハアセチル
しよ糖、プロピレングリコール、水を含
有します。

【保管及び取扱い上の注意】

①小児の手の届かない所に保管して下さい。②直射日光をさけ、キャップを閉めて涼しい所に保管して下さい。③誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れかえないで下さい。④本剤配合のアルコール等は、プラスチック製品や家具・調度品等の塗装を傷つけることがありますので、薬液がつかないように注意して下さい。⑤使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。⑥火気に近づけないで下さい。

【内容量】100mL

販売名：新トクホンチール

【お客様相談室】

☎0120-687-355

（受付時間 9:00～12:00、13:00～17:00
／土・日・祝日は除く）

製造販売元

株式会社 トクホン

〒105-0014 東京都港区芝2-28-8

副作用被害救済制度

☎0120-149-931

刺激 じっくり タイプ

TOKUHON

腰痛

100mL



■特長

すぐれた
消炎鎮痛効果

心地よい刺激感

血行促進

第3類医薬品

外用消炎鎮痛液剤

新

トクホンチール