

ご使用に際してこの説明書を必ずお読みください。また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

△ 使用上の注意

【してはいけないこと】

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用がおこりやすくなる）

1. 次の部位には使用しないこと
 - 1) 目の周囲、粘膜など
 - 2) 湿疹、かぶれ、傷口

【相談すること】

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - ・ 薬などによりアレルギー症状をおこしたことがある人
2. 使用後、皮膚に発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、はれ、痛みなどの症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書をもって医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
3. 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この説明書をもって医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【効能又は効果】

腰痛、打撲、捻挫、肩こり、関節痛、筋肉痛、筋肉疲労、しもやけ、骨折痛

【成分及び分量】

有効成分 100mL中
 ℓ-メントール……………6.0g
 サリチル酸グリコール……………3.0g
 ビタミンE酢酸エステル……………0.5g
 クロルフェニラミンマレイン酸塩……………0.1g
 ノニル酸ワニリルアミド……………12mg
 添加物としてアルコール、ハセチルシヤ糖、プロピレングリコール、水含有します。

【保管及び取扱い上の注意】

①小児の手の届かない所に保管してください。②直射日光をさけ、キャップを閉めて涼しい所に保管してください。③誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れかえないでください。④本剤配合のアルコールなどは、プラスチック製品や家具・調度品などの塗装を傷つけることがありますので、薬液がつかないように注意してください。⑤使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。⑥火気に近づけないでください。

刺激 じんわり タイプ



肩こい

100mL



肩こり・腰痛・筋肉痛



トクホンチール

外用鎮痛消炎液剤

第3類医薬品



【用法及び用量】

適量を1日数回患部に塗布してください。

1. 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。また、刺激が強く感じられることがあるため、13歳未満の人への使用はさけてください。
2. 目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯でよく洗い、症状が重い場合には眼科医の診療を受けてください。
3. 外用にのみ使用し、内服しないでください。
4. 入浴の1時間前には使用しないでください。使用直後に入浴すると強い刺激を感じる場合があります。
5. 皮膚の弱い人は同じ所続けて使用しないでください。
6. 使用前に腕などに少量を塗布し、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、はれ、痛みなどの症状がおきないことを確かめてから使用してください。
7. 塗布した所はよく乾かしてください。乾かないうちに衣類などが触れると、変色することがありますので注意してください。
8. 強い刺激を感じた場合には、よく泡立てた石鹸でやさしく患部を洗い流し、その後よく冷やしてください。

第3類医薬品

【内容量】100mL 販売名：新トクホンチール

火気厳禁

第二石油類 危険等級Ⅲ 100mL

大正製薬(株) お客様119番室

電話 03-3985-1800

受付時間 8:30～21:00(土、日、祝日を除く)

発売元

大正製薬株式会社

東京都豊島区高田3丁目24番1号

<http://www.taisho.co.jp>

製造販売元

株式会社 トクホン

東京都豊島区高田3丁目26番3号

副作用被害救済制度 ☎ 0120(149)931

刺激 じんわり タイプ



腰痛

100mL



■ 特長

すぐれた
鎮痛消炎効果

心地よい刺激感

血行促進

肩こり・腰痛
筋肉痛

第3類医薬品



トクホンチール

外用鎮痛消炎液剤

100mL 第3類医薬品