

毛じらみ、かいせん、水虫、たむし用薬

日本薬局方 **イオウ・サリチル酸・チアントール軟膏「日薬」**

毛じらみ及びびかいせんはシラミやダニにより発生する病気です。水虫、たむしは、白癬菌というカビ（真菌）が皮膚表面の角質層に寄生しておこる疾患です。イオウ・サリチル酸・チアントール軟膏「日薬」は有効成分のはたらきにより、シラミ、ダニを殺したり、白癬菌を殺菌し、不快なかゆみを改善します。

⚠ 使用上の注意**⊗ してはいけないこと**

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起
こりやすくなります。）

次の部位には使用しないで下さい。

- (1) 目や目の周囲、粘膜（例えば口腔、鼻腔、膈等）
- (2) 湿疹
- (3) 湿潤、ただれ、亀裂や外傷のひどい患部

**相談すること**

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談して下さい。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 乳幼児
 - (3) 本人又は家族がアレルギー体質の人
 - (4) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (5) 患部が顔面または広範囲の人
 - (6) 患部が化膿している人
 - (7) 「湿疹」か「水虫、いんきんたむし、ぜにたむし」かがはっきりしない人（陰のうにかゆみ、ただれ等の症状がある場合は、湿疹等他の原因による場合が多い。）
2. 次の場合には、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談して下さい。

(1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、はれ、刺激感、落屑、ただれ、乾燥、つっぱり感、水疱

(2) 2週間位使用しても症状がよくなる場合

成分と作用

成 分	100g 中	作 用
イオウ	10g	皮膚表面で徐々に硫化水素を形成して皮膚寄生生物の発育を阻み、同時に角質軟化作用により、薬剤の疾患部浸透を容易にします。
チアントール	10mL	イオウを含む化合物で、イオウと同じように働く他、消炎作用とかゆみを止める作用もあります。
サリチル酸	3g	防腐、抗菌作用と角質軟化作用があります。
酸化亜鉛	10g	収れん作用があります。

添加物：マクロゴール

効能・効果

毛じらみ、水虫、いんきんたむし、ぜにたむし、かいせん

用法・用量

1日数回患部に塗布して下さい。

保管及び取扱上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しいところに保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かないところに保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変化します。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。なお、使用期限内であっても開封後は品質保持の点からなるべく早く使用して下さい。

毛じらみ治療のポイント

毛じらみが発生している部位より広めによく塗布し、2～3時間そのままにしてから、櫛やブラシで一旦すいてからお湯で洗って下さい。2日ほど経ってから更にもう一度繰り返します(卵がふ化することもありますので)。

かいせん、水虫治療のポイント

症状の現れている範囲より広がっていることが多いので、薬剤は広めに塗布して下さい。又、次のことに注意して下さい。

- ①根気よく続けて下さい。
かゆみが無くなっても、まだダニや真菌は毛穴・角質層に生きています。再発を防いで下さい。
- ②患部を乾燥させて下さい。
通気性の悪い靴下や靴は感心しません。むれを防いで下さい。
- ③衣類や住居も清潔に
靴、靴下、スリッパ、浴室のマットも清潔にして感染を防いで下さい。
- ④患部は常に清潔に
ダニ、白癬菌増殖の抑制や二次感染を防ぐために患部はよく洗い清潔に保ちましょう。

■お問い合わせ先

〒841-0032 鳥栖市大正町716
日本薬品株式会社 お客様相談室
電話 0942(82)2029
FAX 0942(82)2036
受付時間：9時から17時まで(土、日、祝日を除く)

製造販売元



日本薬品株式会社

鳥栖市大正町716

(05D)