

ご使用に際し、この添付文書を必ずお読み下さい。また必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。
☆最初にキャップを開封する場合、中栓が飛び出すことがありますので、目に入らないようにご注意下さい。

水虫・たむし用くすり
水虫薬 エフゲン (F-GEN)



水虫・たむし（いんきんたむし、ぜにたむし）はカビの一種である白癬菌の繁殖によって起こる皮膚病です。この白癬菌は表皮の角質層下に寄生しますので、その治療には角質層下に薬剤が浸透することが大切です。水虫薬エフゲンは白癬菌に対して抗菌作用のあるウンデシレン酸と角質層を軟化させ浸透性を高めるサリチル酸を配合した水虫・たむし治療薬です。



使用上の注意

してはいけないこと（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります）

次の部位には使用しないでください

- (1)目や目の周囲、粘膜（例えば、口腔、鼻腔、膣等）、陰のう、外陰部等。
- (2)湿疹。(3)湿潤、ただれ、亀裂や外傷のある患部。



相談すること

1、次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談ください。

- (1)医師の治療を受けている方。(2)乳幼児。
- (3)本人又は家族がアレルギー体質の方。
- (4)薬や化粧品等によるアレルギー症状を起こしたことがある方。
- (5)患部が顔面や広範囲の方。(6)患部が化膿あるいは湿潤やただれがひどい方。
- (7)「湿疹」か「水虫、いんきんたむし、ぜにたむし」かがはっきりしない方。
(陰のうにかゆみ・ただれ等の症状がある場合は、湿疹等他の原因の場合が多い)

2、次の場合は直ちに使用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談ください。

(1)使用后、次の症状があらわれた場合

| 関係部位 | 症 状 |
|------|----------------------|
| 皮 膚 | 発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、はれ、刺激感 |

(2)2週間位使用しても症状がよくならない場合

効能・効果 みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし

用法・用量

大人1日1～2回添付のハケあるいは適当な脱脂綿又はガーゼに本品をつけ塗布します。

患部をよく洗ってから薬剤を塗布しますと皮膚を軟らかくして薬剤浸透を助けます。

水虫で爪をおかされている場合は、爪の表面の硬い所をツメヤスリ等で薄く剥がし爪の上から中まで浸透する様に念入りに塗って下さい。

この意味から入浴後の治療は効果的です。水虫治療は表面上の症状で判断することなく、白癬菌が絶滅するまで継続することが肝要です。通気性の悪い靴下など、なるべく使用をさけてください。

(用法及び用量に関する注意事項)

(1)患部やその周囲が汚れたまま使用しないでください。

(2)目に入らないようご注意ください。

万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診断を受けてください。

(3)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。

(4)外用にのみ使用してください。

成分・分量 100mL中

ウンデシレン酸 3.0 g

サリチル酸 4.0 g

添加物としてPH調整剤、アルコールを含有する。

保管及び取扱い上の注意

(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所にキャップをしめて密栓して保管してください。

(2)小児の手の届かない所に保管してください。

(3)他の容器に入れ替えないでください。

(4)使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。なお、使用期限内であっても開封後は品質保持の点からなるべく早く使用してください。

消費者相談窓口

本品についてのお問い合わせはお買い求めのお店又は下記までお願いします。

足のマークの
製造・販売元 **大源製薬株式会社**

〒660-0085 尼崎市元浜町5丁目79番地 電話番号 06-6418-0278

受付時間 9:00～17:00(土・日祝を除く) 時間外にもメールでのお問い合わせができます。

ホームページアドレス <http://www.e-daigen.co.jp> メールアドレス seiyaku@e-daigen.co.jp