2014年３月改訂

MATSUDA CHEMICAL INDUSTRIES, LTD.

第２類医薬品

ご使用に際しては、この説明文書を必ず読んでください。
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

水虫・たむし
エフチール®液S
F.CHIL-S

⚠ 使用上の注意

してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります）

1．次の部位には使用しないでください
(1) 目や目の周囲、粘膜（例えば、口腔、鼻腔、膣等）、陰のう、外陰部等。
(2) 湿疹。
(3) 湿潤、ただれ、亀裂や外傷のひどい患部。

相談すること

1．次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 乳幼児。
(3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(4) 患部が顔面又は広範囲の人。
(5) 患部が化膿している人。
(6) 「湿疹」か「みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし」かがはっきりしない人。（陰のうにかゆみ・ただれ等の症状がある場合は、湿疹等他の原因による場合が多い。）

2．使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、はれ、刺激感

3．２週間位使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【効 能・効 果】

水虫、ぜにたむし、いんきんたむし

【用　　法】

1日2～3回、適量を患部に塗布してください。

〔用法〕に際しての注意

(1) 患部やその周囲が汚れたまま使用しないでください。
(2) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けてください。
(3) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
(4) 外用にのみ使用してください。
(5) 使用前によく振とうしてください。

【成 分・分 量】 100mL中

トルナフタート …… 2.0 g
サリチル酸 …… 5.0 g
木槿皮チンキ …… 30.0mL
（木槿皮 6,000mgに相当）
その他、添加物として、マクロゴール、メチルエチルケトン及びエタノールを含有する。

〔保管及び取扱い上の注意〕

(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
(2) 小児の手の届かない所に保管してください。
(3) 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わります。）
(4) 火気に近づけないでください。
(5) 使用期限の過ぎた製品は使用しないでください。

〈お問い合わせ先〉

本剤のご使用により、変わった症状があらわれるなど、何かお気付きの点がございましたら、お買い求めの薬局・薬店又は下記会社「相談窓口」までご連絡頂きますようお願い申し上げます。

製造販売元：**松田薬品工業株式会社**
本社・工場　愛媛県松山市河野中須賀318
電話（089）994－1333
［受付時間　8:30～17:00（土・日・祝日を除く）］