

ご使用に際しては、この説明文書を必ず読んでください。
また、必要なときに読めるよう大切に保存してください。

水むし・たむし エフチール[®]軟膏Ⅱ

水虫・たむしなどの皮膚病は「かび」の一種である糸状菌の中でも特に白癬菌が皮膚に寄生して起こる症状で、これらの疾患を放置しておきますと菌は次第に繁殖して皮膚の深部に入り込み治療が非常に困難になりますから、初期のうちに適当な良い薬剤を使用して根治しなければなりません。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

次の部位には使用しないでください

- (1) 目や目の周囲、粘膜 (例えば、口腔、鼻腔、膣等)、陰のう、外陰部等。
- (2) 湿疹
- (3) 湿潤、ただれ、亀裂や外傷のひどい患部



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 乳幼児。
 - (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (4) 患部が顔面又は広範囲の人。
 - (5) 患部が化膿している人。
 - (6) 「湿疹」か「みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし」かがはっきりしない人。(陰のうにかゆみ・ただれ等の症状がある場合は、湿疹等他の原因による場合が多い。)
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、はれ、刺激感

3. 2週間位使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【成 分・分 量】 100 g 中

木槿皮チンキ（木槿皮 6,000mgに相当）	30.0mL
トルナフトート	2.0 g
サリチル酸	2.0 g
アミノ安息香酸エチル	1.0 g
その他、添加物として、マクロゴール、香料を含有する。	

－エフチール軟膏Aの作用と特長－

- ・白癬菌を初め化膿菌に対しても殺菌作用を現わします。
- ・患部に対して深達性の良い水溶性基剤です。
- ・痛みやかゆみの自覚症状をしずめます。
- ・菌の寄生している厚い皮が除去されて治癒が促進されます。

【効 能・効 果】

みずむし、ぜにたむし、いんきんたむし

【用 法】

1日2～3回、適量を患部に塗布してください。

【用法に関する注意】

- (1) 患部やその周囲が汚れたまま使用しないでください。
- (2) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けてください。
- (3) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (4) 外用にのみ使用してください。
- (5) 定められた用法を守ってください。

【治療上の心得】

- ・痒みや痛みの自覚症状が消失した後も、皮膚の深部に菌が残っていることがありますので、油断しないことが大切です。
- ・靴下や下着はなるべく木綿製のものを着用し、毎日とりかえて常に清潔に保つよう心がけましょう。
- ・患部は痒くても決して爪で掻いてはいけません。手袋などして、睡眠中にも患部を掻きこわさないように注意してください。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください（誤用の原因になったり品質が変わります）。
- (4) 使用期限の過ぎた製品は使用しないでください。

〈お問い合わせ先〉

本剤のご使用により、変わった症状があらわれるなど、何かお気づきの点がございましたら、お買い求めの薬局又は下記会社「相談窓口」までご連絡頂きますようお願い申し上げます。

製造販売元： **松田薬品工業株式会社**

愛媛県松山市河野中須賀318

電話 (089)994-1333

[受付時間 8:30～17:00 (土、日、祝日を除く)]