

使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

かゆい水虫にWで効く コザックコートW

水虫治療薬

外用液

コザックコートWは、水虫の原因菌（白せん菌）に対してすぐれた抗菌作用を発揮するトルナフテート配合の水虫治療薬です。

塗布部位に薄い被膜をつくり、薬剤が患部によくとどまる働きに加え、浸透性を高めることによるダブル効果で、水虫を治療します。

【使用上の注意】

してはいけないこと



（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる。）

次の部位には使用しないでください。

- (1)目や目の周囲、粘膜（例えば、口腔、鼻腔、膣等）、陰のう、外陰部等。
- (2)湿疹。
- (3)湿潤、ただれ、亀裂や外傷のひどい患部。

相談すること



1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください。

- (1)医師の治療を受けている人。
- (2)乳幼児。
- (3)本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (4)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (5)患部が顔面又は広範囲の人。
- (6)患部が化膿している人。
- (7)「湿疹」か「みずむし、ぜにたむし、いんきんたむし」かがはっきりしない人。（陰のうにかゆみ・ただれ等の症状がある場合は、湿疹等他の原因による場合が多い。）

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この添付文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。

- (1)使用后、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、はれ、刺激感

- (2)2週間位使用しても症状がよくなる場合。

【成 分】 (1ml中)

トルナフテート……………20 mg
クロタミトン…………… 100 mg
塩酸ジブカイン…………… 2 mg
グリチルレチン酸…………… 5 mg
イソプロピルメチルフェノール…………… 3 mg

添加物としてアルコール、イソプロパノール、エデト酸Na、ジブチルヒドロキシトルエン、ヒドロキシプロピルセルロース、パルミチン酸イソプロピル、メチルエチルケトン、N-メチル-2-ピロリドン含有します。

【効能・効果】

みずむし、ぜにたむし、いんきんたむし。

【用法・用量】

1日1～2回、適量を患部に塗布してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)患部やその周囲が汚れたまま使用しないでください。
- (2)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けてください。
- (3)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (4)外用にのみ使用してください。

コザックコートW 容器のご使用法

- ご使用の都度、図1のように容器を上に向け、先端手の指などで1～2度空押しして、中の空気を抜いてください。気温や手の体温などで容器が温まると、容器内の圧力が高まって、ご使用時に液が多く出る場合があります、これを防ぐためです。
- ご使用に際しては、図2のように容器を下に向け、先端を患部に軽く押しあてて塗布してください。

●ご使用前



図1

●ご使用中



図2

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光のあたらない涼しい所に密栓して箱に入れ、容器を立てた状態で保管してください。
- (2)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4)火気に近づけないでください。
- (5)使用済みの容器は、火中に投じないでください。
- (6)使用期限を過ぎた製品は、使用しないでください。
- (7)合成樹脂(スチロール等)を軟化したり、塗料を溶かすことがありますので、メガネの枠、塗装家具、床(フローリングなど)等につかないようにしてください。

問い合わせ先

- 1) 購入した薬局・薬店
- 2) お客様相談室

住所：〒170-0013 東京都豊島区東池袋3-22-14
電話：03 (3986) 0613
受付時間：9:00～17:00 (土、日、祝祭日を除く)



製造販売元

全薬工業株式会社

東京都豊島区東池袋3-22-14
営業所 東京都文京区大塚5-6-15
<http://www.zenyaku.co.jp>