

この説明書は、ご使用前によくお読みください。
なお、必要な時に読めるように大切に保管してください。

1日1回型 水むし・たむし治療薬

ネクストLX液

速乾性液剤

ネクストLXクリーム

ベタつかないゲルタイプ

第2類医薬品

特長

多忙な現代人の生活にピッタリの1日1回塗布タイプに、かゆみと炎症を抑える成分をプラスしました。

⚠ 使用上の注意

してはいけないこと ☒

守らないと症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。
次の部位には使用しないでください。

- (1) 目や目の周囲、顔面、粘膜（例えば、口腔、鼻腔、膣等）、陰のう、外陰部等
- (2) 湿疹
- (3) 湿潤、ただれ、亀裂や外傷のひどい患部

相談すること



1. 次の方は使用の前に医師又は薬剤師にご相談ください。
 - (1) 医師の治療を受けている方
 - (2) 乳幼児
 - (3) 本人又は家族がアレルギー体質の方
 - (4) 今までに薬や化粧品等によるアレルギー症状（例えば発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等）を起こしたことがある方
 - (5) 患部が広範囲の方
 - (6) 患部が化膿している方
 - (7) 「湿疹」か「みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし」かがはっきりしない方
（陰のうにかゆみ・ただれ等の症状がある場合は、湿疹等他の原因による場合が多い）
2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師にご相談ください。
 - (1) 使用後、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、はれ、刺激感、ただれ等の症状があらわれた場合
 - (2) 2週間位使用しても症状の改善がみられない場合や、本剤の使用により症状が悪化（病巣が使用前より広がる等）した場合

[効能・効果]

みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし

[用法・用量]

患部を清潔にして、1日1回、適量を患部に塗布してください。

【用法・用量に関連する注意】

- (1)患部やその周囲が汚れたまま使用しないでください。
- (2)目に入らないようにご注意ください。万一目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けてください。
- (3)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (4)外用にのみ使用し、内服しないでください。
- (5)定められた用法、用量を厳守してください。

【成分・分量】 1mL又は1g中

成分名	分量	作用等
ビホナゾール	10mg	1日1回で、みずむし菌を殺します。
リドカイン	20mg	かゆみ、痛みを速やかに抑えます。
クロタミトン	50mg	かゆみを持続的に抑えます。
グリチルレチン酸	5mg	炎症を抑えます。
l-メントール	20mg	スツとする使用感でかゆみを軽減します。

添加物：液 ミリスチン酸イソプロピル、マクロゴール、水酸化Na、塩酸、ハアセチルしょ糖、エタノール
クリーム ミリスチン酸イソプロピル、ポリオキシエチレンセチルエーテル、パラベン、カルボキシビニルポリマー、グリセリン、水酸化Na、塩酸

【保管及び取り扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に、密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)誤用を避け、品質を保持するため、他の容器に入れかえないでください。
- (4)火気に近づけないでください（ネクストLX液）。
- (5)使用期限（外箱記載）を過ぎた製品は使用しないでください。

みずむし治療のポイント

1. 清潔 患部も衣類（靴下）もこまめに洗い清潔に。
2. 乾燥 靴を脱ぐ、靴下も脱ぐ、風通し良く、よく乾燥。
3. 根気 風呂あがりの薬剤治療、痒くなくても1シーズン。

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記までご連絡ください。

[9:00~17:00(土、日及び祝日を除く)]

新生薬品株式会社 消費者相談窓口 電話番号(076)472-0361

〒930-0344 富山県中新川郡上市町森元町7-2

製造販売元

新生薬品株式会社

富山県中新川郡上市町森元町7-2