

ご使用前にこの説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう保管してください。

第2類医薬品

水虫・たむし用薬 ミコナック[®]軟膏

ヒノキチオール配合

- みずむしやたむしは、カビ(真菌)の仲間である白癬菌が皮膚の角質層に寄生しておこる白癬症です。白癬菌は、厚くて緻密な角質層に寄生しているので、薬が浸透しにくく、また白癬菌の抵抗力が非常に強いため、治りにくい皮膚病のひとつです。
- ミコナック軟膏は、白癬菌に対して強い抗菌作用を示すミコナゾール硝酸塩を主薬として、抗菌作用のあるヒノキチオール、みずむしによるかゆみや痛みを抑えるリドカイン、クロタミトンを配合したみずむしに強いはたらきのある水虫軟膏です。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)
次の部位には使用しないこと

- (1) 目や目の周囲、粘膜(例えば、口腔、鼻腔、膣等)、陰のう、外陰部等。
- (2) 湿疹。
- (3) 湿潤、ただれ、亀裂や外傷のひどい患部。



相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 乳幼児。
- (3) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (4) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (5) 患部が顔面又は広範囲の人。
- (6) 患部が化膿している人。
- (7) 「湿疹」か「みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし」かがはっきりしない人。(陰のうにかゆみ・ただれ等の症状がある場合は、湿疹等他の原因による場合が多い。)

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること

- (1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、はれ、刺激感、落屑、ただれ、乾燥・つっぱり感、水疱

- (2) 2週間位使用しても症状がよくなる場合

効能・効果

みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし

用法・用量

1日1～2回、適量を患部に塗布してください。

＜用法及び用量に関する注意＞

- (1) 患部やその周囲が汚れたまま使用しないこと。
- (2) 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けること。
- (3) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- (4) 外用にのみ使用すること。

成分・分量 (100g 中)

成 分	含量	は た ら き
ミコナゾール硝酸塩	1.0g	白癬菌を殺菌します。
ヒノキチオール	0.1g	白癬菌などを殺菌します。
リドカイン	2.5g	患部のかゆみ、痛みをします。
クロタミトン	10.0g	患部のかゆみをします。

添加物：L-メントール、パラベン、プロピレングリコール、セタノール、ゲル化炭化水素

保管及び取り扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) 表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。また開封後は使用期限内であってもなるべく速やかに使用すること。

水虫治療のポイント

白癬菌の寄生は、症状のあらわれている範囲より広がっていることが多いので、薬剤は広めに塗布しましょう。又、次のことに留意してください。

①根気よく継続治療をする かゆみがなくなっても、すっかり治るまで根気よく治療を続け再発を防ぎましょう。 	②患部を乾燥させる 通気性の悪い靴下やゴム長靴は好ましくありません。むれを防ぎ、乾燥に心がけましょう。 
③衣類も清潔にする 靴や靴下、スリッパ、浴室のマットも清潔に保ち感染に注意しましょう。 	④患部をよく洗って清潔にする 白癬菌増殖の抑制や二次感染を防ぐため患部をよく洗い清潔に保ちましょう。 

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願いいたします。

中外医薬生産株式会社 お客様相談室

電話 0595-21-3200

受付時間 9:00～17:00 (土・日・祝祭日を除く)



製造販売元

中外医薬生産株式会社

三重県伊賀市ゆめが丘7-5-5