



ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

水虫・たむし用薬 1日1回で効く

ラミシールAT[®]クリーム

日本薬局方 テルビナフィン塩酸塩クリーム

第②類医薬品

水虫・たむしは白癬菌〈水虫菌〉というカビ(真菌)が皮膚表面にある角質層に感染・寄生しておきる皮膚病です。ラミシールAT クリームは、スイス・ノバルティス社が開発した殺真菌成分テルビナフィン塩酸塩を配合する水虫・たむし治療薬です。

特 徴

- 有効成分である「テルビナフィン塩酸塩」の優れた殺真菌作用と角質層への浸透力は、1日1回の塗布で薬剤が患部に留まり、かゆみや痛みなどを引き起こす水虫・たむしに持続的に効果を発揮し、症状を治していきます。
- べとつかない、サラッとした使いごちのよいクリームです。びらん(ジクジク)型の患部にお勧めします。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は使用しないでください
本剤による過敏症(例えば、発疹・発赤、かゆみ、はれ等)を起こしたことがある人
2. 次の部位には使用しないでください
 - (1) 目や目の周囲、粘膜(例えば、口腔、鼻腔、膣等)、陰のう、外陰部等
 - (2) 湿疹
 - (3) 湿潤、ただれ、亀裂や外傷のひどい患部



相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 妊婦又は妊娠している可能性のある人
 - (3) 乳幼児
 - (4) 本人又は家族がアレルギー体質の人
 - (5) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (6) 患部が顔面又は広範囲の人
 - (7) 患部が化膿している人
 - (8) 「湿疹」か「みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし」かがはっきりしない人
(陰のうにかゆみ・ただれ等の症状がある場合は、湿疹等他の原因による場合が多い。)
2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください
 - (1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かぶれ、かゆみ、はれ、刺激感、熱感、 ^{ひんせつ} 鱗屑・ ^{らくせつ} 落屑(フケ、アカのような皮膚のはがれ)、ただれ、乾燥・つっぱり感、皮膚の亀裂

- (2) 2週間位使用しても症状が良くならない場合や、本剤の使用により症状が悪化した場合



効能・効果

みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし

用法・用量


1日1回適量を患部に塗布してください。

【用法・用量に関する注意】

1. 定められた用法を厳守してください。
2. 患部やその周囲が汚れたまま使用しないでください。
3. 本剤のついた手で、目や粘膜にふれないでください。
4. 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けてください。
5. 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
6. 外用にのみ使用してください。

〈チューブの穴の開け方〉

キャップを逆さにして、突起部をチューブの先に強く押し当てて開けてください。



成分 (1g中)

テルビナフィン塩酸塩……………10mg

添加物:セタノール、ステアリルアルコール、パルミチン酸セチル、ミリスチン酸イソプロピル、モノステアリン酸ソルビタン、ポリソルベート60、ベンジルアルコール、pH調節剤

保管及び取扱い上の注意

1. 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
2. 小児の手の届かない所に保管してください。
3. 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。)
4. 使用期限をすぎた製品は使用しないでください。また、開封後は使用期限内であってもなるべく速やかに使用してください。

水虫治療のアドバイス

水虫・たむしの原因である白癬菌(水虫菌)は、症状があらわれている範囲より広く寄生していることが多いので、薬剤を広めに塗布することをお勧めします。また、以下のことに留意して使用してください。

1. 根気よく継続治療する

- かゆみなどの症状がなくなった後も、約1ヵ月間は、根気よく治療を続けてください。



2. 患部を清潔にする

- 白癬菌の増殖を抑え、二次感染を防ぐため、患部をよく洗い清潔に保ってください。
- 薬剤を塗布した後、患部にふれた手や指もしっかり洗ってください。



3. 患部の乾燥に心がける

- 白癬菌はじめじめした環境を好みます。入浴あとや、スポーツなどで汗をかいたあとはしっかり患部を乾燥させてください。
- 通気性の悪い靴・靴下はなるべく避け、患部を乾燥させるよう心がけてください。



4. 履き物なども清潔に

- 靴、靴下、スリッパ、浴室のマットなども清潔に保ち、感染に注意してください。
- 靴のむれは水虫の温床になります。数足を毎日順番にはきかえるよう心がけてください。



お問い合わせ先

製品についてのお問い合わせは、下記にお願い致します。

ノバルティス ファーマ株式会社 〒106-8618 東京都港区西麻布4-17-30
 お客様相談室 電 話 03 (5766) 2615
 受付時間 9:00~17:00
 (土日祝・その他当社休業日を除く)

製品に関する情報はこちら <http://www.lamisil-at.jp>

副作用被害救済制度のお問い合わせ先
 (独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
 電話:0120-149-931 (フリーダイヤル)

NOVARTIS

製造販売元
 ノバルティス ファーマ株式会社
 東京都港区西麻布4-17-30