

ご使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

魚の目・タコ・イボ用薬

第 2 類医薬品

イボコロリ絆創膏・F

イボコロリ絆創膏・F はサリチル酸の角質軟化溶解作用を利用した医薬品(角質剥離剤)です。厚く硬くなった皮ふをやわらかくし、魚の目・タコ・イボを取り除きます。患部の大きさに合わせて自由にカットでき、粘着性があるので、患部に密着して有効成分サリチル酸の浸透効果を高めます。又保護用パッドが外部の刺激による患部の痛みをやわらげます。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の人は使用しないでください。
乳幼児(7才未満)
2. 次の部位には使用しないでください。
①顔面、目の周囲や唇、粘膜など。
②首などの皮ふのやわらかい部分。
③炎症又は傷のある患部。
3. 次の症状には使用しないでください。
①水イボ
②老人性イボ(黒褐色の扁平なイボ)
③尖圭コンジローム(肛門周囲や外陰部にできたイボ)
④一列に並んだイボ、群生したイボ、身体に多発したイボ。



相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください。
①本人又は家族がアレルギー体質の人。
②薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
③妊婦又は妊娠していると思われる人。
④糖尿病の治療を受けている人。
⑤医師の治療を受けている人。
2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。
①本剤の使用により、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

②本剤を使用しても症状の改善がみられない場合

3. 本剤をイボにご使用の場合、本剤が有効なのは表面がザラザラした硬い角質化したイボです。他のイボについては医師又は薬剤師に相談してください。

【効能・効果】

魚の目、タコ、イボ

【用法・用量】

サリチル酸絆創膏を患部の大きさに合わせて切り、患部を覆うように貼り付けます。次に魚の目など圧迫や接触で痛むときには、患部の大きさに合ったパッドを選び、必要に応じて貼ります。さらに、固定用テープで固定します。
※裏面〈イボコロリ絆創膏・Fの上手な使い方〉をご覧ください。

〈用法及び用量に関連する注意〉

- ①定められた用法及び用量をお守りください。
- ②薬剤部分をさわった手で目の周囲をさわると成分が目に入る場合があるので注意してください。また異常を感じた場合は直ちに眼科医の診療を受けてください。
- ③本剤は外用にのみ使用し、内服しないでください。
- ④小児に使用する場合には、必ず保護者の指導監督のもとに使用してください。
- ⑤薬剤部分が健康な皮ふに付着すると、その部分も白く軟化し、痛んだりするので、患部からずれないように使用してください。

【成 分】

膏体100g中サリチル酸50g含有。
添加物として精製ラノリン、エステルガム、ポリブテン、生ゴムを含む。

【保管及び取扱い上の注意】

- ①小児の手のとどかない所に保管してください。
- ②直射日光をさけ、なるべく湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- ③誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れかえないでください。

＜イボコロリ絆創膏・Fの上手な使い方＞

サリチル酸絆創膏
(角質軟化剤)




保護用パッド
(粘着剤付)




固定用テープ




- ①患部を清潔に乾いた状態にします。サリチル酸絆創膏を患部の大きさに合わせて切り、患部に貼ります。
※入浴後、患部をよく拭いてからご使用になると一層効果的です。
※サリチル酸絆創膏が健康な皮ふにつかないように患部よりやや小さめに切ってください。



- ②圧迫や接触で患部が痛む場合は、患部の大きさに合った保護用パッドを選び、1枚もしくは必要に応じて2枚重ねて貼ります。



- ③固定用テープを貼り、サリチル酸絆創膏がずれないようにしっかり密着させます。



- ④2～3日貼り続けますと有効成分サリチル酸が浸透し、患部が白く変化してきます。
※サリチル酸絆創膏が患部からずれたり、入浴等で絆創膏がはがれた場合は貼り替えてください。ぬれた場合は水分をよく拭き取ってご使用ください。
- ⑤白く軟化しはがれ始めた患部をピンセット等で痛みを感じない程度に取り除いてください。患部をお湯につけると取り除きやすくなります。
※痛む場合は無理に取り除かないでください。
- ⑥患部が完全に取れるまで①～⑤の要領で繰り返しご使用ください。患部が取れた後、皮ふは自然に再生されます。
※魚の目はしん(角質柱)を完全に取り除かないと再発します。
※イボを取り除くと滑らかな皮ふが見えてきます。

【お問い合わせ先】

横山製薬株式会社 お客様相談室 電話(078)911-2948(代)
受付時間 9:00～12:00、13:00～17:00(土・日・祝日を除く)

第2類医薬品



イボコロリのフットケア ——— SINCE 1900

横山製薬株式会社

〒673-0882 兵庫県明石市相生町2丁目2番16号

L081003