

使用前にこの説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう保管してください。

かゆみをともなう乾燥肌治療薬

エピナール

第2類医薬品

◆私たちの体を覆っている皮膚は、環境の変化により外界のさまざまな刺激にさらされています。また、近年エアコン等の普及により一年中部屋の空気が乾燥するようになり、室内においても皮膚が乾燥してかゆみが生じる方が増えています。

◆**エピナール**は、乾燥した肌に水分を保持する働きを持つ尿素、トコフェロール酢酸エステルに、かゆみ止め成分のリドカイン、ジフェンヒドラミン塩酸塩、d-カンフルを配合した広くのびてベタつかずステロイドを含まないクリーム剤です。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の部位には使用しないでください。

- (1) 目の周囲、粘膜等。
- (2) 炎症又は傷のある患部。
- (3) かさぶたの様に皮膚がはがれている患部。



相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。

- (1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、刺激感（痛み、熱感、ぴりぴり感）、かさぶたの様に皮膚がはがれる状態

- (2) 2週間位使用しても症状がよくなる場合

効能・効果

かゆみをとこなう乾燥性皮膚（老人・成人の乾皮症、小児の乾燥性皮膚）

用法・用量

1日1～数回、適量を患部に塗布してください。

＜用法及び用量に関連する注意＞

- (1) 定められた用法・用量を守ってください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には眼科医の診療を受けてください。
- (4) 本剤は外用にのみ使用し、内服しないでください。
- (5) 本剤のついた手で、目などの粘膜に触れないでください。
- (6) 化粧品ではないので、基礎化粧品等の目的で顔面には使用しないでください。

成分・分量

(100g中)

成 分	含量	は た ら き
尿素	10.0g	角質の水分保持能力を高めます。また、かたくなった皮ふをやわらかくします。
ジフェンヒドラミン塩酸塩	1.0g	抗ヒスタミン作用によりかゆみをしずめます。
d-カンフル	1.0g	患部に清涼感を与え、かゆみや炎症をしずめます。
リドカイン	2.0g	局所麻酔作用により、かゆみをしずめます。
トコフェロール酢酸エステル	0.3g	血行を良くし、組織の修復を助けます。

添加物として、ポリオキシエチレンソルビタンモノステアレート、パラベン、ステアerylアルコール、セタノール、プロピレングリコール、トリエタノールアミン、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、カルボキシビニルポリマー、セバシン酸ジエチルを含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れかえないでください。（誤用の原因になったり品質が変わる。）
- (4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

本品についてのお問い合わせは
お買い求めのお店又は下記にお願い致します。

万協製薬株式会社

電話 0598-37-2088

受付時間 AM10:00～PM5:00

（ただし、土、日、祝日を除きます。）

発売元

小林薬品工業株式会社

東京都中央区日本橋箱崎町40番6号

製造販売元

万協製薬株式会社

三重県多気郡多気町五桂1169-142