

乾燥性皮膚用薬 ケラチナミン^{コーワ} 20%尿素配合クリーム

- 水仕事などで手がカサカサする。
- かかとが硬くコチコチになる。
- ひじ、ひざ、くるぶしが黒ずんでザラザラする。

これらは、皮膚が乾燥する時期に特に多い症状です。こうした症状を放っておきますと、皮膚のガサつき(ドライスキン)が更にひどくなったり、角質層が厚くなったりして、症状が悪化する場合があります。

本剤は、こうした症状を効果的に治療するために、すぐれたドライスキン改善作用をもつ尿素20%をOTC医薬品として初めて処方したお薬です。

お使いになりますと、20%尿素が働いて、体の中にある水分を皮膚の角質層に効率よくとり込み、皮膚表面から水分が飛ばないようにしてくれますので、「皮膚をみずみずしくさせる効果」があります。しかも、「皮膚をなめらかにする効果」がいまって、皮膚を正常な状態に治してくれます。

⚠使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

次の部位には使用しないこと

- (1)目のまわり、粘膜等。
- (2)引っかき傷等のきずぐち、亀裂(ひび割れ)部位。
- (3)かさぶたの様に皮膚がはがれているところ。
- (4)炎症部位(ただれ・赤くはれているところ)。



相談すること

- 1.次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談すること
 - (1)医師の治療を受けている人。
 - (2)本人又は家族がアレルギー体質の人。
 - (3)薬や化粧品等によりアレルギー症状(発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある人。
- 2.次の場合は、直ちに使用を中止し、この添付文書を持って医師又は薬剤師に相談すること
 - (1)使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、刺激感(いたみ、熱感、ぴりぴり感)、かさぶたの様に皮膚がはがれる状態

- (2)2週間使用しても症状がよくならない場合

効能・効果

手指のあれ、ひじ・ひざ・かかと・くるぶしの角化症、
老人の乾皮症、さめ肌

用法・用量

1日数回適量を患部に塗擦する。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)用法・用量を守ること。
- (2)目に入らないよう注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。
- (3)小児（15歳未満）には使用させないこと。
- (4)外用にのみ使用すること。
- (5)化粧品ではないので、効能・効果で定められた患部のみに使用し、基礎化粧等の目的で顔面には使用しないこと。

成分・分量（100g中）

成分・分量		働 き
尿 素	20.0g	体内の水分を皮ふに取りこんで、皮ふをしっとりなめらかにします。

〔添加物〕ワセリン、流動パラフィン、セタノール、ステアリルアルコール、ポリソルベート60、ステアリン酸ソルビタン、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、グリシン

保管及び取扱い上の注意

- (1)本剤のついた手で、目など粘膜に触れないこと。
- (2)高温をさけ、直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。
- (3)小児の手の届かない所に保管すること。
- (4)他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。）
- (5)使用期限（外箱及び容器に記載）をすぎた製品は使用しないこと。

本製品に関するお問い合わせは
興和株式会社 医薬事業部 お客様相談センターへお願いします。
〒103-8433 東京都中央区日本橋本町三丁目4-14
TEL 03-3279-7755 FAX 03-3279-7566
電話受付時間：月～金（祝日を除く）9:00～17:00



製造 興 和 株 式 會 社
販売元 東京都中央区日本橋本町三丁目4-14